РАЗРАБОТКА И ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИХ АНТИТЕЛ К ПЕМБРОЛИЗУМАБУ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ ИНГИБИРОВАНИЯ СВЯЗЫВАНИЯ ПЕМБРОЛИЗУМАБА С ЕГО МИШЕНЬЮ PD-1 МЕТОДОМ ИФА

Кудряшова А. М.¹,
Гребенкин Д. Ю.²,
Самсонов М. Ю.³,
Филон О. В.³,
Разживина В. А.³,
Чернобровкин М. Г.⁴,
Борисова О. В.¹

¹ ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, Россия, Москва.

² ООО «Экзактэ Лабс», Россия, Москва.

³ АО "Р-Фарм", Россия, Москва.

⁴ ООО «Рисерч лаб», Россия, Москва.

**DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A METHOD FOR
DETERMINING NEUTRALIZING ANTIBODIES TO PEMBROLIZUMAB
IN HUMAN SERUM BASED ON INHIBITION OF BINDING OF
PEMBROLIZUMAB TO ITS PD-1 TARGET BY ELISA**

Kudryashova A. M.^a,
Greibenkin D. Yu.^b,
Samsonov M. Yu.^c,
Filon O. V.^c,
Razzhivina V. A.^c,
Chernobrovkin M. G.^d,
Borisova O. V.^a

^a Mechnikov Research Institute of Vaccines and Sera5a, Moscow, Russia.

^b Exakte Labs LLC, Moscow, Russia.

^c R-Pharm JSC, Leninsky Prospekt, room 1, Moscow, Russia.

^d Research Lab LLC, Russia, Moscow.

Резюме

Гуманизированные моноклональные антитела могут вызывать нежелательный гуморальный иммунный ответ у пациентов - образование антител к терапевтическому белковому препарату. Нейтрализующие антилекарственные антитела являются одним из основных факторов, влияющих на безопасность и эффективность проводимой терапии. При невозможности использовать тесты для определения нейтрализующих антител на основе клеточных культур альтернативой могут служить методы конкурентного связывания лекарственного средства и его лиганда. Пембролизумаб относится к противоопухолевым препаратам широкого спектра и представляет собой гуманизированное IgG4 каппа антитело к рецептору запрограммированной клеточной смерти-1 (PD-1) которое блокирует взаимодействие рецептора с его лигандами PD-L1 и PD-L2. В связи со сложностью проведения анализа применение культурального клеточного теста для пембролизумаба невозможно, так как высок риск получения недостоверных результатов.

Цель. Разработка и валидация методики определения нейтрализующих антител к пембролизумабу в сыворотке крови человека на основе ингибирования связывания пембролизумаба с его мишенью PD-1.

Материал и методы. В исследование был использован экспериментальный препарат пембролизумаб RPH-075 (P-Фарм). В качестве положительного контрольного образца на нейтрализующие антитела использовали Anti-Pembrolizumab антитела KRIBIOLISATM Anti-Pembrolizumab (KEYTRUDA®) ELISA, Индия)). Определение антител проводили методом ИФА с применением кислотной диссоциации иммунного комплекса и с использованием техники ACE (Affinity capture elution).

Результаты. Была разработана и валидирована методика выявления нейтрализующих антител к пембролизумабу, основанная на ингибировании пембролизумаба с его мишенью PD-1 в сочетании с техникой ACE. **Разработанная методика была валидирована по показателям: селективность, чувствительность, специфичность, «хук»-эффект, толерантность к присутствию лекарственного препарата, прецизионность.** Благодаря применению подходов предварительной обработки образцов (кислотная диссоциация, техника ACE) для анализа нейтрализующих антител, была достигнута чувствительность 100 нг/мл в присутствии циркулирующего пембролизумаба 40 мкг/мл. Так же в данной работе был обоснован метод расчета предела исключения, чувствительности и селективности на основании ROC-анализа и плавающего предела исключения (PSCP) через средние арифметические значения ОП NC и LPC в каждом индивидуальном аналитическом планшете.

Заключение. Разработанная методика определения нейтрализующих антител к пембролизумабу может быть использована для оценки нежелательной иммуногенности препарата пембролизумаба на стадии клинических испытаний.

Ключевые слова: ИФА; пембролизумаб; иммуногенность; нейтрализующие антитела; PD-1; клинические исследования; лекарственная толерантность; валидация.

Abstract

Monoclonal antibodies (mAbs) have the potential to trigger undesired humoral immune responses in the patients and the formation of ADA (anti-drug antibody) to a drug protein.

Neutralizing anti-drug antibodies are one of the main factors affecting the safety and effectiveness of the therapy. If it is impossible to use cell-based tests to determine neutralizing antibodies, competitive ligand binding assay it can be used as an alternative.

Pembrolizumab is a broad-spectrum antitumor drug and is a humanized IgG4 kappa antibody to the programmed cell death receptor-1 (PD-1) that blocks the interaction of the receptor with its ligands PD-L1 and PD-L2. Due to the complex analysis, the use of a cell culture test for pembrolizumab is impossible, as there is a high risk of obtaining unreliable results.

Aim. Development and validation of a method for determining neutralizing antibodies to pembrolizumab in human serum based on inhibition of binding of pembrolizumab to its PD-1 target.

Material and methods. The experimental drug pembrolizumab RPH-075 (R-Pharm) was used in the study. Anti-Pembrolizumab antibodies KRIBIOLISATM Anti-Pembrolizumab (KEYTRUDA®) ELISA, India) were used as a positive control sample for neutralizing antibodies. The determination of antibodies was carried out by the ELISA method with using acid dissociation of the immune complex and the ACE technique (Affinity capture elution).

Results. The ELISA method was validated according to the following characteristic: selectivity, sensitivity, specificity, "hook" effect, drug tolerance, precision. Due to the use of sample pretreatment approaches (acid dissociation, ACE technique) for the analysis of neutralizing antibodies, a sensitivity of 100 ng/ml was achieved in the presence of pembrolizumab 40 µg/ml.

In this paper, a method for calculating the cut-point, sensitivity, and selectivity based on ROC analysis and floating exclusion limit (PSCP) through the average values of OD NC and LPC in each individual analytical cycle was substantiated.

Conclusion. The developed method for determining neutralizing antibodies to pembrolizumab can be used to assess the undesirable immunogenicity of the pembrolizumab at the stage of clinical trials.

Keywords: ELISA, immunogenicity, pembrolizumab, neutralizing antibodies, PD-1, clinical trials, drug tolerance, validation.

1 Введение

2 Большой сегмент фармацевтического рынка на сегодняшний день
3 представлен гуманизированными моноклональными антителами (МАТ),
4 которые могут вызывать нежелательный гуморальный иммунный ответ у
5 пациентов - образование антител к терапевтическому белковому препарату.
6 Такие антитела оказывают влияние на фармакокинетику, фармакодинамику,
7 безопасность и эффективность биотерапевтического препарата.
8 Соответственно, тестирование на иммуногенность является неотъемлемой
9 частью процесса разработки лекарственных средств. Как правило, для
10 мониторинга иммуногенности в отношении терапевтических МАТ
11 используется многоуровневый подход, включающий этапы скрининга,
12 подтверждения, титра и нейтрализующей активности. Нейтрализующие
13 антилекарственные антитела (НАТ) являются одним из основных факторов,
14 влияющих на безопасность и эффективность проводимой терапии, и поэтому
15 их оценка имеет особое значение при тестировании на иммуногенность.
16 Методы выявления нейтрализующих антител обычно основаны на их
17 способности блокировать взаимодействие терапевтического препарата с
18 мишенью, и «золотым стандартом» в определении нейтрализующей
19 активности являются тесты на основе клеточных линий, экспрессирующих
20 соответствующую мишень и максимально точно имитирующих механизм
21 действия антител в живом организме [22, 27].

22 Методы для определения нейтрализующих антител *in vitro*, основанные
23 на ингибировании взаимодействия лекарственного средства и его лиганда,
24 также могут быть применимы, например, когда существуют ограничения в
25 использовании подходящей клеточной линии, интерференции с компонентами
26 анализируемой матрицы, интерференции с препаратами сопутствующей
27 терапии [22, 9]. При невозможности использовать тест-системы на основе
28 клеточных культур альтернативой могут служить методы конкурентного
29 связывания лиганда или другие методы, для которых доказана релевантность
30 в отношении установления нейтрализующей активности [1, 6].

31 Одной из важных проблем при разработке методик для выявления
32 антител к терапевтическим МАТ, в том числе нейтрализующих, является
33 наличие высоких концентраций циркулирующего лекарственного средства.
34 Данное явление часто наблюдается для препаратов с длительным периодом
35 полувыведения, к которым, в большинстве случаев, относятся и
36 терапевтические антитела. В присутствии циркулирующего лекарственного
37 средства нейтрализующие антитела могут существовать в виде иммунных
38 комплексов и по этой причине не имеют возможности взаимодействовать с
39 компонентами тест-системы, используемой в анализе, что может приводить к
40 ложноотрицательным результатам [12].

41 В данной работе разработана и валидирована методика определения
42 нейтрализующей активности антител к пембролизумабу, основанная на
43 способности нейтрализующих антител блокировать взаимодействие

44 пембролизумаба с рецептором PD-1, тем самым опосредовано показывая
45 потерю функциональных характеристик препарата.

46 Использование культурального клеточного теста для данного препарата
47 не возможно в связи со сложностью проведения анализа и, как следствие, с
48 риском получения недостоверных результатов.

49 Пембролизумаб относится к противоопухолевым препаратам широкого
50 спектра, так называемым регуляторам иммунного синапса или блокаторам
51 иммунных чекпоинтов. Пембролизумаб представляет собой
52 гуманизованное IgG4 каппа антитело к рецептору запрограммированной
53 клеточной смерти-1 (PD-1) которое блокирует взаимодействие между
54 рецептором PD-1 и его лигандами PD-L1 и PD-L2. Терапия препаратами
55 направленными против рецептора PD-1, включая препараты пембролизумаба,
56 может проводиться в течение длительных периодов времени и достигать до 2
57 лет [17], что в свою очередь может способствовать индукции нейтрализующих
58 антител. Кроме того, в отличие от моноклональных терапевтических антител,
59 направленных на угнетение активации В-клеток, например, против CD19 или
60 CD20, нацеленность пембролизумаба на PD-1, экспрессия которого высока на
61 фолликулярных Т-хелперах, опосредованно увеличивает выработку В-
62 клетками антител в лимфатических узлах, что может прямо или косвенно
63 влиять на гуморальные иммунные реакции, приводящие к индукции антител к
64 данному препарату [4, 10]. Биоаналитические подходы к выявлению
65 связывающих и нейтрализующих антител подробно описаны в научных
66 публикациях [11, 18, 24, 26].

67 В данной работе для повышения лекарственной толерантности была
68 разработана и валидирована методика, основанная на ингибировании
69 связывания препарата пембролизумаба с его мишенью PD-1 с применением
70 кислотной диссоциации иммунного комплекса и с использованием техники
71 ACE (Affinity capture elution) [3, 5].

72 2 Материалы и методы

73 В исследовании был использован препарат RPH-075 (АО «Р-Фарм»,
74 Россия), содержащий пембролизумаб в концентрации 25 мг/мл. В качестве
75 положительного контрольного образца на нейтрализующие антитела
76 использовали Anti-Pembrolizumab, антитела к пембролизумабу
77 лиофилизированные, концентрат, 1 мкг/мл (Реагент Набора для определения
78 KRIBIOLISATM Anti-Pembrolizumab (KEYTRUDA®) ELISA, Индия)).
79 Эукариотический рекомбинантный белок PD-1, (Cloud-Clone Corp). Для
80 иммунохимического анализа использовали планшеты 96-луночные,
81 прозрачные, плоскодонные, высокое связывание Costar® (2592, Corning Inc.,
82 США). Получение конъюгата пембролизумаба с пероксидазой хрена
83 осуществляли по методу Накане [15]. Для биотинилирования PD-1
84 использовали набор (ООО «Силекс», Россия).

85 Для проведения теста на устойчивость методики к присутствию
86 лекарственного препарата готовили модельные образцы, путем добавления к
87 пулливированной сыворотке крови здоровых доноров препарата

88 пембролизумаба (до 40 мкг/мл, что соответствовало ожидаемой концентрации
89 препарата в исследуемых образцах) и контрольных антител к пембролизумабу,
90 препятствующих его связыванию с мишенью. Перед проведением анализа
91 полученные модельные образцы оставляли инкубироваться при комнатной
92 температуре по меньшей мере в течение 60 минут для образования иммунных
93 комплексов.

94 **Методика определения нейтрализующей активности антител к**
95 **пембролизумабу в сыворотке крови человека иммуноферментным**
96 **методом с иммобилизованным пембролизумабом (методика 1).** Этапы
97 проведения анализа схематически представлены на Рис.1.1.

98 Пембролизумаб сорбировали в 0,02 М фосфатном буфере (рН 7,2) в
99 концентрации 0,75 мкг/мл. Планшеты выдерживали в течение 19-22 часов при
100 температуре (4-8) °С и блокировали раствором 0,09% казеината в 0,02 М
101 фосфатном буферном растворе рН 7,2, содержащем 0,05% Твин 20. Далее во
102 все лунки с иммуносорбентом вносили по 60 мкл 600 мМ уксусной кислоты и
103 по 10 мкл анализируемых образцов и инкубировали при температуре 37 °С в
104 течение 30 минут и перемешивании 700 об/мин. Далее во все лунки вносили
105 по 30 мкл 1М трис-буфера и инкубировали при температуре 37 °С в течение
106 60 минут и перемешивании 700 об/мин. После во все лунки с вносили по 100
107 мкл PD-1, конъюгированного с биотином в концентрации 250 нг/мл и
108 инкубировали при температуре 37 °С в течение 30 минут и перемешивании 700
109 об/мин. Затем во все лунки с вносили по 100 мкл стрептавидина,
110 конъюгированного с пероксидазой хрена и инкубировали при температуре 37
111 °С в течение 30 минут и перемешивании 700 об/мин. Далее отмывали не
112 связавшиеся реагенты и вносили по 100 мкл 33 мМ цитратного буферного
113 раствора рН 4,0, содержащего 0,01% перекиси водорода и 0,5 мМ 3,3',5,5'-
114 тетраметилбензидина. Через 15 мин реакцию останавливали добавлением 50
115 мкл 2N серной кислоты, измеряли оптическую плотность (ОП) в
116 двухволновом режиме при основной длине волны 450 нм.

117 **Методика определения нейтрализующей активности антител к**
118 **пембролизумабу в сыворотке крови человека иммуноферментным**
119 **методом с использованием техники ACE (Acid capture elution) (методика**
120 **2).**

121 Техника ACE включает в себя следующие этапы, схематически
122 представленные на Рис.1.2.

123 *Иммуносорбент №1.* Пембролизумаб сорбировали в 0,02 М фосфатном
124 буфере (рН 7,2) в концентрации 40 мкг/мл. Далее планшеты блокировали
125 согласно методике 1.

126 *Иммуносорбент №2.* PD-1 сорбировали в карбонатном буфере (рН 9,6)
127 в концентрации 100 нг/мл. Далее планшеты блокировали согласно методике 1.

128 Во все лунки с Иммуносорбентом №1 вносили по 80 мкл 600 мМ
129 уксусной кислоты и по 20 мкл анализируемых образцов и инкубировали при
130 температуре 37 °С в течение 30 минут и перемешивании 700 об/мин. Далее во
131 все лунки вносили по 40 мкл 1М трис-буфера и инкубировали при температуре

132 37 °С в течение 90 минут и перемешивании 700 об/мин. После проводили
133 отмывание не связавшихся компонентов и вносили по 110 мкл 300 мМ
134 уксусной кислоты далее инкубировали при температуре 37 °С и
135 перемешивании 700 об/мин в течение 30 минут. Далее в планшеты для
136 предварительного разведения вносили по 30 мкл 1М трис-буфера и по 100 мкл
137 диссоциированных образцов из Иммуносорбента №1. Следом вносили по 25
138 мкл рабочего конъюгата, пембролизумаба конъюгированного с пероксидазой
139 хрена и инкубировали при температуре 37 °С и перемешивании 700 об/мин в
140 течение 30 минут.

141 После инкубации с конъюгатом переносили по 100 мкл во все лунки
142 Иммуносорбента №2 и инкубировали при температуре 37 °С в течение 30
143 минут и перемешивании 700 об/мин. После отмывания не связавшихся
144 компонентов визуализацию результатов анализа и замер проводили, как
145 описано выше.

146 При наличии нейтрализующих антител в образце пембролизумаб,
147 конъюгированный с пероксидазой хрена не взаимодействует или
148 взаимодействует ограниченно с PD-1 на планшете.

149 **Статистическая обработка результатов.**

150 Полученные данные анализировали с помощью программных
151 обеспечений SPSS Statistics (IBM) и Microsoft Office Excel 2019.

152 **3 Результаты**

153 Основной задачей разработки методики по определению НАТ к
154 пембролизумабу являлась чувствительность не менее 100 нг/мл в присутствии
155 данного препарата на уровне до 40 мкг/мл (что соответствовало ожидаемой
156 концентрации препарата в исследуемых образцах). Поскольку при разработке
157 и валидации методики отсутствовали клинические образцы, содержащие
158 нейтрализующие антитела к пембролизумабу, оценка была сделана с
159 использованием суррогатных нейтрализующих антител из коммерческого
160 набора, с подтвержденной способностью препятствовать связыванию
161 пембролизумаба с мишенью.

162 В данной работе на стадии разработки для определения
163 нейтрализующих антител к пембролизумабу сравнивали две методики с
164 разным способом ингибирования связывания пембролизумаба с PD-1.
165 Схематично методики представлены на Рис.1.

166 В сравниваемых методиках для дифференциации отрицательных
167 образцов от положительных использовали индекс позитивности (ИП), т.е.
168 отношение ОП_{образца}/ОП_{PSCP}, ОП_{PSCP} (plate-specific cut point-PSCP, предел
169 исключения, порогового значения оптической плотности, рассчитываемого
170 для каждого планшета), рассчитывали по формуле:

$$171 \text{ ОП}_{\text{PSCP}} = (\text{ОП}_{\text{NC средн.}} + \text{ОП}_{100 \text{ нг/мл}}) / 2 \quad (1), \text{ где}$$

172 ОП_{NC средн.} – среднее арифметическое значение ОП контрольной
173 пулированной сыворотки крови, не содержащей антитела к лекарственному
174 препарату (NC), в 4-х повторах;

175 ОП₁₀₀ нг/мл - среднее арифметическое значение ОП контрольной
176 пулированной сыворотки крови, нагруженной 100 нг/мл коммерческих
177 антител к лекарственному препарату, в 4-х повторах. Чувствительность ≤ 100
178 нг/мл принималась как приемлемая.

179 Образцы с ИП ≤ 1 считались содержащие НАТ к пембролизумабу, а с
180 ИП >1 не содержащие НАТ к пембролизумабу.

181 Влияние циркулирующего пембролизумаба оценивали, как в холостой
182 контрольной пробе (пулированная сыворотка крови человека 10 здоровых
183 доноров, не содержащая антитела к пембролизумабу) так и в контрольной
184 пробе, нагруженной коммерческими нейтрализующими антителами к
185 пембролизумабу на уровне 100 нг/мл.

186 При оценке методики, соответствующей схеме 1.1. не было выполнено
187 требование по необходимой чувствительности методики 100 нг/мл. При
188 изучении показателей чувствительности и лекарственной толерантности
189 положительный результат был получен только в образце, содержащего 1000
190 нг/мл НАТ в присутствии 40 мкг/мл пембролизумаба (см. Рисунок 2).

191 В свою очередь результаты данного исследования показали, что, при
192 использовании предварительной обработки образцов методом АСЕ были
193 получены результаты, соответствующие критериям приемлемости для данной
194 методики. Все холостые образцы на всех уровнях тестируемого
195 циркулирующего лекарственного препарата были правильно
196 классифицированы как отрицательные (ИП >1). В то время как образцы,
197 содержащие НАТ на уровне 100 нг/мл были определены как положительные
198 при концентрации пембролизумаба 40 мкг/мл (см Рисунок 1). Таким образом
199 для дальнейшей валидации при определении НАТ к пембролизумабу была
200 выбрана методика с использованием техники АСЕ.

201 **Предел исключения, чувствительность, специфичность.**

202 При валидации методики проведено сравнение расчета ОП_{PSCP} по
203 формуле (1) и при помощи ROC-анализа, где ОП_{PSCP} определяли, как значение
204 ОП, в котором специфичность и чувствительность равны 100%, что указывает
205 на способность методики однозначно классифицировать образцы на
206 положительные и отрицательные. При этом в каждом аналитическом цикле
207 (проведении анализа в индивидуальном планшете) используется плавающий
208 предел исключения ОП_{PSCP}.

209 Для валидации тест-системы были проанализировали 60 образцов
210 сывороток крови человека параллельно в виде холостых образцов и в виде
211 образцов, нагруженных коммерческими антителами к пембролизумабу
212 (Krishgen BioSystems) до концентрации 100 нг/мл. Анализ выполняли в рамках
213 трёх валидационных серий, каждая из которых включала 20 пар образцов,
214 исходных и с добавкой. Результаты сравнения двух подходов к определению
215 ОП_{PSCP} представлены в таблице 1.

216 **Устойчивость методики к присутствию лекарственного препарата**

217 Для оценки возможности методики получать устойчивые результаты и
218 детектировать антитела в присутствии биологического препарата была

219 проведена оценка ее толерантности к присутствию лекарственного препарата
220 (drug tolerance). Для этого были проанализированы образцы на двух уровнях
221 концентраций антител к пембролизумабу 250 нг/мл (MPC) и 100 нг/мл (LPC)
222 с добавлением и без добавления лекарственного препарата до уровня
223 концентрации 20 и 40 мкг/мл в образце. Для интерпретации полученных
224 данных рассчитали относительное отклонение значений оптической
225 плотности для образцов с добавлением и без добавления препарата.
226 Критерием приемлемости является сохранение аналитического отклика
227 положительных образцов ниже OP_{PSCP} .

228 Результаты представлены в Табл. 2, и показывают, что все образцы,
229 содержащие антитела к пембролизумабу в концентрации 100 и 250 нг/мл, в
230 присутствии пембролизумаба до 40 мкг/мл определялись как содержащие
231 нейтрализующие антитела к лекарственному препарату, что соответствует
232 необходимому уровню толерантности.

233 **Прецизионность**

234 Для оценки прецизионности использовали образцы трех уровней
235 концентраций 500 нг/мл (NPC), 250 нг/мл (MPC), 100 нг/мл (LPC) и NC. Для
236 оценки использовали шесть независимых контрольных образцов каждого
237 уровня концентрации. Для интерпретации полученных данных рассчитали КВ,
238 % значений оптической плотности для образцов каждого уровня
239 концентрации в аналитическом цикле.

240 Использовали следующие критерии приемлемости: значения ОП для
241 контрольных образцов в подтверждающем тесте соответствовали:
242 $OP_{NPC} < OP_{MPC} < OP_{LPC} < PSCP < NC$. Коэффициент вариации (КВ) не должен
243 превышать 20% для положительных образцов. Коэффициент вариации внутри
244 каждого из 6 циклов для каждого контрольного образца не превышал 8%,
245 данные по воспроизводимости между циклами представлены в Таблице 3.

246 **Специфичность**

247 Специфичность это способность однозначно оценивать определяемое
248 вещество и не давать перекрестной реактивности со структурно родственными
249 соединениями. Так как пембролизумаб является гуманизированным
250 моноклональным антителом, включающим гиперварибельным участком
251 иммуноглобулина мыши, то в качестве его структурно родственного
252 соединения были выбраны другие лекарственные препараты – олокизумаб и
253 трастузумаб. Для оценки специфичности использовали образцы
254 пембролизумаба (100 нг/мл) и NC в вариантах без добавки или с добавкой
255 антител к олокизумабу (на уровне 1000 нг/мл). По результатам анализа
256 усредненное значение ОП должно быть ниже PSCP для LPC и выше PSCP для
257 интактной сыворотки.

258 **«Хук»-эффект и линейность отклика**

259 Наблюдалось снижение оптической плотности градуировочных
260 образцов с увеличением концентрации антител к пембролизумабу (обратная
261 зависимость), что позволило доказать отсутствие «хук»-эффекта до
262 концентрации 1000 нг/мл. В данном исследовании верхняя точка проверки

263 диапазона была ограничена концентрацией образца положительного
264 контроля, используемой ИФА тест-системы.

265 4 Обсуждение

266 Решение Коллегии ЕЭК № 89 [1] допускает при невозможности
267 (недоступности) нейтрализующих методов количественного определения на
268 основе клеток использовать методы конкурентного связывания с лигандом
269 или другие альтернативы. Однако при их использовании необходимо
270 обосновать, что данные методы отражают нейтрализующую способность
271 (активность) исследуемых антител [8]. Для такого обоснования можно учесть
272 точку зрения Руководства FDA [6], которое в вопросах обоснования
273 не клеточного подхода ссылается на работу [19], в которой описываются его
274 следующие научные обоснования: исследуемый препарат блокирует белок-
275 мишень (особенно, если препарат представляет собой моноклональное
276 антитело); для реализации действия препарат не должен попадать внутрь
277 клетки. Действительно, препарат пембролизумаб соответствует данным
278 условиям: он является моноклональным антителом, блокирующим PD-1;
279 механизм действия пембролизумаба реализуется на поверхности клеток Т-
280 лимфоцитов, на которых располагаются рецепторы PD-1. В любом из
281 указанных тестов серьезной проблемой является циркулирующее
282 лекарственное средство, при этом его присутствие даже в минимальных
283 количествах может значительно повлиять на результаты анализа, вызывая
284 ложноположительные или ложноотрицательные результаты.

285 Наличие циркулирующих моноклональных антител приводит к тому,
286 что нейтрализующие антитела в формате анализа связывания с
287 иммобилизованным препаратом вступают в иммунный комплекс с препаратом
288 в образце, тем самым препятствуя их обнаружению и приводя к
289 ложноотрицательному результату. Высокие концентрации циркулирующего
290 лекарственного средства также могут связываться с мишенью, используемой
291 в анализе, что будет конкурировать с лекарственным средством,
292 используемым в качестве детекторного реагента в анализе, и подавлять
293 сигнал, приводя к ложноположительному результату. Такие затруднения
294 могут повлиять на интерпретацию результатов анализа, что приведет к
295 серьезным последствиям, как для безопасности пациентов, так и для
296 производителей данных препаратов в случае ложноположительной
297 иммуногенности препарата. В научных публикациях описаны различные
298 подходы для устранения влияния циркулирующего лекарственного средства
299 на результат анализа [14, 16, 21, 23, 24, 25].

300 В нашем исследовании мы предложили подход для определения
301 нейтрализующих антител к пембролизумабу, позволяющий решить проблему
302 вмешательства циркулирующего терапевтического моноклонального
303 антитела (до 40 мкг/мл), присутствовавшего в анализируемых образцах. На
304 первом этапе проводили кислотную диссоциацию иммунного комплекса,
305 далее применяли технику ACE и проводили анализ конкурентного связывания
306 PD-1 с пембролизумабом, конъюгированным с пероксидазой хрена.

307 Свою роль играет и то, что для определения иммуногенности, как
308 связывающих, так и нейтрализующих антител нет эталонного стандарта,
309 который мог бы достоверно оценивать иммуногенность к данному препарату.
310 Поэтому при разработке анализов, в том числе на нейтрализующие антитела,
311 на данный момент используют суррогатные контроли, которые могут обладать
312 не такой иммуногенностью, как нейтрализующие антитела, продуцируемые
313 против препарата у пациентов. Тем не менее мировая практика при изучении
314 иммуногенности использует данные контроли при невозможности
315 использования другого варианта [13, 21]. При этом при разработке на
316 нейтрализующие антитела главным критерием методики является
317 демонстрация потери функциональной активности препарата, и суррогатные
318 контроли в этом случае достоверно имитируют данный механизм.

319 **5 Выводы**

320 Была разработана и валидирована методика выявления нейтрализующих
321 антител к пембролизумабу, основанная на ингибировании пембролизумаба с
322 его мишенью PD-1 в сочетании с техникой ACE.

323 Благодаря применению подходов, описанных в данной работе к
324 предварительной обработке образцов для анализа нейтрализующих антител,
325 была достигнута лекарственная толерантность при рекомендованной
326 чувствительности 100 нг/мл в присутствии циркулирующего пембролизумаба
327 40 мкг/мл.

328 Был обоснован метод расчета предела исключения, чувствительности и
329 селективности на основании ROC-анализа и плавающего предела исключения
330 (PSCP) через средние арифметические значения ОП NC и LPC в каждом
331 индивидуальном аналитическом планшете.

ТАБЛИЦЫ

Таблица 1. Результаты определения предела исключения при помощи ROC-анализа и по формуле (1), метода расчета при использовании в расчете OP_{PSCP} среднего арифметического значений ОП отрицательных образцов и ОП этих же образцов, нагруженных антителами к пембролизумабу до концентрации 100 нг/мл.

Table 1. The results of determining the exclusion limit using ROC analysis and formula (1), a calculation method using the arithmetic mean of the OD of negative samples and OD of the same samples loaded with antibodies to pembrolizumab up to a concentration of 100 ng/ml.

Наименование параметра Parameter	1 цикл анализа, n=20 1 cycle of analysis, n=20	2 цикл анализа, n=20 2 cycle of analysis, n=20	3 цикл анализа, n=20 3 cycle of analysis, n=20
Чувствительность, 95% ДИ Sensitivity, 95% DI	100% (83,89% - 100,0%)	100% (83,89% - 100,0%)	100 % (83,89% - 100,0%)
Специфичность, 95% ДИ Specificity, 95% CI	100 % (83,89% - 100,0%)	100% (83,89% - 100,0%)	100% (83,89% - 100,0%)
OP_{PSCP} , рассчитанный по ROC-кривой OP_{PSCP} , calculated from the ROC curve	1,923	1,692	1,924
OP_{PSCP} , рассчитанный по формуле (1) OP_{PSCP} , calculated according to the formula (1)	1,924	1,709	1,953
p-val	<0,0001	<0,0001	<0,0001

Таблица 2. Результаты устойчивости к лекарственному препарату. СО (SD)-стандартное отклонение, КВ, % (CV, %)-коэффициент вариации. Контроли LPC-100 нг/мл MPC-250 нг/мл содержат антител к пембролизумабу в присутствии пембролизумаба 20 мкг/мл (+ 20 мкг/мл) и 40 мкг/мл (+40 мкг/мл).

Table 2. The results of drug tolerance. CO (SD) is the standard deviation, KV, % (CV, %) is the coefficient of variation. Control LPS-100 ng/ml MP-250 ng/ml contain antibodies to pembrolizumab in the presence of pembrolizumab 20 μ /ml (+ 20 μ /ml) and 40 μ /ml (+40 μ /ml).

Образец Sample	Оптическая плотность Optical density $OD_{PSCP} / ОП_{PSCP} = 2,0259$				Средне е Mean	СО SD	КВ, % CV, %
	ОП1	ОП2	ОП3	ОП4			
LPC	1,376	1,235	1,261	1,380	1,313	0,08	5,8
MPC	0,805	0,753	0,764	0,742	0,766	0,03	3,6
LPC+AT, μ g/ml 20	1,359	1,517	1,471	1,660	1,501	0,12	8,3
LPC+AT, μ g/ml 40	1,890	1,674	1,537	1,683	1,696	0,15	8,6
MPC+AT, μ g/ml 20	0,827	0,998	0,987	0,812	0,906	0,10	11,1
MPC+AT, μ g/ml 40	1,033	1,033	0,984	1,082	1,033	0,04	3,9
NC	2,232	2,243	2,238	2,297	2,252	0,03	1,3

Таблица 3. Прецизионность методики определения нейтрализующей активности антител к пембролизумабу в ходе шести серий. СО-стандартное отклонение, КВ, %, -коэффициент вариации.

Таблица 3. The precision of the method for determining the neutralizing activity of antibodies to pembrolizumab during six series. SD is the standard deviation, %, CV, % is the coefficient of variation.

Образец Sample	Оптическая плотность Optical density								КВ, % CV, %
	1	2	3	4	5	6	Среднее Mean	СО SD	
НРС	0,697	0,730	0,540	0,489	0,575	0,644	0,612	0,094	15,3
МРС	0,910	0,901	0,707	0,868	0,875	0,924	0,864	0,080	9,2
ЛРС	1,493	1,490	1,258	1,188	1,406	1,503	1,390	0,136	9,8
НС	2,376	2,414	2,298	2,240	2,333	2,424	2,347	0,071	3,0
ПСР	1,935	1,952	1,778	1,714	1,869	1,963	1,869	0,093	5,0

РИСУНКИ

Рисунок 1. Этапы определения нейтрализующей активности антител к пембролизумабу в сыворотке крови человека иммуноферментным методом через иммобилизованный пембролизумаб 1.1. и с использованием техники ACE (Acid capture elution) 1.2.

Figure 1. Determination of the neutralizing activity of antibodies to pembrolizumab in human blood serum by ELISA with immobilized pembrolizumab 1.1. and using ACE (Acid capture elution) technique 1.2.

1.1.

1.2.

Рисунок 2. Оценка чувствительности методик в присутствии свободного пембролизумаба 40 мкг/мл. ИП-индекс позитивности.

Figure 2. Assessment of the sensitivity of the techniques in the presence of free pembrolizumab 40 mcg/ml. IP is an index of positivity.

ИП / IP

Рисунок 3. Зависимость оптической плотности (ОП) от концентрации антител к пембролизумабу, обратная зависимость.

Figure 3. The dependence of optical density (OD) on the concentration of antibodies to pembrolizumab, the inverse relationship.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ_МЕТАДААННЫЕ

Блок 1. Информация об авторе ответственном за переписку

Кудряшова Александра Михайловна,

научный сотрудник лаборатории медицинской биотехнологии, ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова;

адрес: Служебный адрес: РФ, Москва, 1-я Дубровская улица, д. 15;

тел. сотовый: 8(903)223-82-50;

тел. служебный: 8(495)674-54-97;

e-mail: 2238250@rambler.ru;

Kudryashova Alexandra Mikhailovna,

researcher of laboratory of medical biotechnology, Mechnikov Research Institute of Vaccines and Sera;

address: Russia, Moscow, 1-ya Dubrovskayas treet, 15.

mobile phone: 8(903)223-82-50;

office phone: 8(495)674-54-97;

e-mail: 2238250@rambler.ru

Блок 2. Информация об авторах

Гребенкин Дмитрий Юрьевич. кандидат фармацевтических наук, заведующий лабораторией. ООО «Экзактэ Лабс». 117246, Россия, Москва, Научный проезд, 20, стр.2.

Grebenkin Dmitry Yuryevich, Ph.D., chief of laboratory. Exakte Labs LLC. 117246, Nauchny proezd, p. 2, Moscow, 117246, Russia.

Самсонов Михаил Юрьевич - кандидат медицинских наук, директор медицинского департамента.

Samsonov Mikhail Yuryevich - Ph.D., Director of the Medical Department R-Pharm JSC. 119421, Leninsky Prospekt, room 1, Moscow, 119421, Russia.

Филон Ольга Владимировна - директор департамента доклинической и клинической разработки. АО "Р-Фарм". 119421, Россия, Москва, Ленинский пр-т, д. 111, к. 1.

Filon Olga Vladimirovna - Director of the Department of Preclinical and Clinical Development. R-Pharm JSC. 119421, Leninsky Prospekt, room 1, Moscow, 119421, Russia.

Разживина Виктория Александровна - кандидат биологических наук, руководитель отдела клинических исследований АО "Р-Фарм". 119421, Россия, Москва, Ленинский пр-т, д. 111, к. 1.

Razzhivina Victoria Aleksandrovna - Ph.D., Head of the Clinical Research Department. R-Pharm JSC. 119421, Leninsky Prospekt, room 1, Moscow, 119421, Russia.

Чернобровкин Михаил Геннадьевич - кандидат химических наук, заведующий лабораторией ООО «Рисерч лаб». 117218, Россия, Москва, ул. Кржижановского, д. 15, к. 5, этаж 2 ПОМ.V, КОМ. 201, ОФ.2.

Chernobrovkin Mikhail Gennadievich - Candidate of Chemical Sciences, Head of the Laboratory. Research Lab LLC. 117218, Russia, Moscow, Krzhizhanovskogo str., 15, room 5, floor 2 ROOM.V., ROOM 201, OFFICE 2.

Борисова Ольга Васильевна, кандидат химических наук, заведующий лабораторией. ¹ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова. 105064, Россия, Москва, Малый Казенный переулок, д.5а.

Borisova Olga Vasilievna, Ph.D., chief of laboratory. ¹Mechnikov Research Institute of Vaccines and Sera 5a Maly Kazenniy Lane, Moscow, 105064, Russia

Блок 3. Метаданные статьи

РАЗРАБОТКА И ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИХ АНТИТЕЛ К ПЕМБРОЛИЗУМАБУ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ ИНГИБИРОВАНИЯ СВЯЗЫВАНИЯ ПЕМБРОЛИЗУМАБА С ЕГО МИШЕНЬЮ PD-1 МЕТОДОМ ИФА
DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A METHOD FOR DETERMINING NEUTRALIZING ANTIBODIES TO PEMBROLIZUMAB IN HUMAN SERUM BASED ON INHIBITION OF BINDING OF PEMBROLIZUMAB TO ITS PD-1 TARGET BY ELISA

Сокращенное название статьи для верхнего колонтитула:

НАТ К ПЕМБРОЛИЗУМАБУ ИФА
NAB TO PEMBROLIZUMAB ELISA

Ключевые слова: ИФА; пембролизумаб; иммуногенность; нейтрализующие антитела; PD-1; клинические исследования; лекарственная толерантность; валидация.

Keywords: ELISA, immunogenicity, pembrolizumab, neutralizing antibodies, PD-1, clinical trials, drug tolerance, validation.

Иммунологические методы.

Количество страниц текста – 9,

Количество таблиц – 3,

Количество рисунков – 3.

06.02.2025

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Порядковый номер ссылки	Авторы, название публикации и источника, где она опубликована, выходные данные	ФИО, название публикации и источника на английском	Полный интернет-адрес (URL) цитируемой статьи или ее doi.
1	Решение Совета ЕЭК от 03.11.2016 № 89 «Об утверждении Правил проведения исследований биологических лекарственных средств Евразийского экономического союза».	Decision of the EEC Council dated 03.11.2016 No. 89 "On approval of the Rules for Conducting Research on Biological Medicinal Products of the Eurasian Economic Union".	-----
2	Butterfield A. M., Chain J. S., Ackermann B. L., & Konrad, R. J. Comparison of assay formats for drug-tolerant immunogenicity testing. <i>Bioanalysis</i> , 2010, 2 no. 12, pp. 1961–1969.		DOI: 10.4155/bio.10.136.
3	Chen Y. Q., Thomas G Pottanat T.G., Carter Q.L., Troutt J.S., Konrad R.J., Sloan J.H. Affinity capture elution bridging assay: a novel immunoassay format for detection of anti-therapeutic protein antibodies <i>.Journal of Immunological Methods</i> , 2016, vol. 431, pp. 45-51.		DOI: 10.1016/j.jim.2016.02.008
4	Baxi S., Yang A., Gennarelli R.L., Khan N., Wang Z., Boyce L., Deborah K. Immune-related adverse events for		DOI: 10.1136/bmj.k793.

	anti-PD-1 and anti-PD-L1 drugs: systematic review and meta-analysis. BMJ, 2018, vol.17:360:k793.		
5	Bourdage J.S., Cook C.A., Farrington D.L., Chain J.S., Konrad R.J. An Affinity Capture Elution (ACE) assay for detection of anti-drug antibody to monoclonal antibody therapeutics in the presence of high levels of drug. Journal of immunological methods, 2007, vol. 327, no.1-2, pp. 10-7.		DOI: 10.1016/j.jim.2007.07.004.
6	FDA: Guidance for Industry: Immunogenicity Testing of Therapeutic Protein Products – Developing and Validating Assays for Anti-Drug Antibody Detection. U.S. Department of Health and Human Services Food and Drug Administration Center for Drug Evaluation and Research (CDER). Center for Biologics Evaluation and Research (CBER) January. 2019.		-----
7	Gupta S., Indelicato S.R., Jethwa V., Kawabata T., Kelley M., Mire-Sluis A.R., Richards S. M., Rup B., Shores E., Swanson S.J., Wakshull E. Recommendations for the design, optimization, and qualification of cell-based assays used for the detection of neutralizing antibody responses		DOI: 10.1016/j.jim.2006.12.004.

	elicited to biological therapeutics. Journal of immunological methods. 2007, vol. 321, no.1-2, pp. 10-18.		
8	Gunn 3rd. G. R., <u>Sealey D. C. F.</u> , <u>Jamali F.</u> , <u>Meibohm B.</u> , <u>Ghosh S.</u> , <u>Shankar G.</u> From the bench to clinical practice: understanding the challenges and uncertainties in immunogenicity testing for biopharmaceuticals. Clin Exp Immunol, 2016, vol. 184, no. 2, pp. 137-146.		DOI: 10.1111/cei.12742.
9	Hu J, Wala I, Han H, Nagatani J, Barger T, Civoli F., Kaliyaperumal A., Zhuang Y., Shalini Gupta S. Comparison of cell-based and non-cell based assay platforms for the detection of clinically relevant anti-drug neutralizing antibodies for immunogenicity assessment of therapeutic proteins. Journal of Immunological Methods, 2015, vol. 321, no. 1-2, pp. 1–18.		DOI: 10.1016/j.jim.2006.12.004.
10	Khoja L., Day D., Wei-Wu Chen T., Siu L.L., Hansen AR. Tumour- and class-specific patterns of immune-related adverse events of immune checkpoint inhibitors: a		DOI: 10.1093/annonc/mdx286.

	systematic review. <i>Ann Oncol</i> , 2017, vol. 28, no. 10, pp. 2377–85.		
11	Knezevic I., Kang H.N., Thorpe R. Immunogenicity assessment of monoclonal antibody products: a simulated case study correlating antibody induction with clinical outcomes. <i>Biologicals</i> , 2015, vol. 43, no. 5, pp. 5307–17.		DOI: 10.1016/j.biologicals.2015.06.009.
12	Krishna M., Nadler S. G. Immunogenicity to biotherapeutics—the role of anti-drug immune complexes. <i>Frontiers in immunology</i> , 2016, vol., pp.721.		DOI: 10.3389/fimmu.2016.00021
13	Mora J., Palmer R., Wagner L., Wu B., Partridge M. 2023 White Paper on Recent Issues in Bioanalysis: ISR for ADA Assays, the Rise of dPCR vs qPCR, International Reference Standards for Vaccine Assays, Anti-AAV TAb Post-Dose Assessment, NanoString Validation, ELISpot as Gold Standard (Part 3 - Recommendations on Gene Therapy, Cell Therapy, Vaccines Immunogenicity & Technologies; Biotherapeutics Immunogenicity & Risk Assessment; ADA/NAb Assay/Reporting Harmonization). <i>Bioanalysis</i> , 2024, vol. 16, no. 7, pp.77–119.		DOI:119.10.4155/bio-2024-0024.

14	Niu H., Klem T., Yang J., Qiu Y., Pan L. A biotin-drug extraction and acid dissociation (BEAD) procedure to eliminate matrix and drug interference in a protein complex anti-drug antibody (ADA) isotype specific assay. J Immunol Methods, 2017, no. 446, pp. 30-36.		DOI:10.1016/j.jim.2017.04.002.
15	Nakane P.K., Kawaoi A. J. Peroxidase-labeled antibody. A new method of conjugation. Histochem. Cytochem, 1974, vol. 22, no. 2, pp.1084-1091.		DOI: 10.1177/22.12.1084.
16	Nath N., Flemming R., Godat B., Urh M. Development of NanoLuc bridging immunoassay for detection of anti-drug antibodies. J Immunol Methods, 2017, no. 450, pp. 17-26.		DOI:10.1016/j.jim.2017.07.006.
17	Sasson S. C., Wilkins L. E., Watson R. A., Jolly C., Brain O., Klenerman P., Olsson-Brown A., Fairfax B. Identification of neutralising pembrolizumab anti-drug antibodies in patients with melanoma. Sci Rep, 2021, vol. 11, no. 1, pp. 19253.		DOI:10.1038/s41598-021-98700-7.
18	Shankar G., Arkin S., Cocea L., Devanarayan V., Kirshner S., Kromminga A., Quarmby V., Richards S., Schneider C. K., Subramanyam M., Swanson S., Verthelyi D., Yim S. American Association of Pharmaceutical Scientists Assessment and reporting of the clinical immunogenicity		DOI: 10.1208/s12248-014-9599-2.

	of therapeutic proteins and peptides-harmonized terminology and tactical recommendations. AAPS J., 2014, no. 16, pp. 658–73.		
19	Richards S. Amaravadi L., Pillutla R., Birnboeck H., Torri A., Kyra J Cowan K.J., Papadimitriou A., Garofolo F., Satterwhite C., Piccoli S., Wu B., Krinos-Fiorotti C., Allinson J., Berisha F., Cocea L., Croft S., Fraser S., Galliccia F., Gorovits B., Gupta S., Gupta V., Haidar S., Hottenstein C., Ishii-Watabe A., Jani D., Kadavil J., Kamerud J., Kramer D., Litwin V., Santos G.M.L., Nelson R., Ni Y., Pedras-Vasconcelos J., Qiu Y., Paul Rhyne P., Safavi A., Saito Y., Savoie N., Kara Scheibner K., Schick E., Siguenza P. Y., Smeraglia J., Staack R.F., Subramanyam M., Sumner G., Thway T., Uhlinger D., Ullmann M., Vitaliti M., Welink J., Whiting C.C., Xue L., Zeng R. White Paper on recent issues in bioanalysis: focus on biomarker assay validation (BAV):(Part 3–LBA, biomarkers and immunogenicity). Bioanalysis, 2016, vol. 8, no. 23, pp. 2475-2496.		DOI: 10.4155/bio-2016-4989.
20	Wadhwa M., Knezevic I., Kang H.N., Thorpe R. Immunogenicity assessment of biotherapeutic products: an		DOI:0.1016/j.biologicals.2015.06.004.

	overview of assays and their utility. <i>Biologicals</i> , 2015, no. 43, pp. 298–306.		
21	Weiner J. A. , Natarajan H., Calum J., McIntosh C., Yang E. S., Choe M., Papia C. L., Axelrod K. S., Gabriela Kovacicova G., Pegu A., Ackerman M.E. Selection of positive controls and their impact on anti-drug antibody assay performance. <i>J Immunol Methods</i> , 2024, no. 528, pp. 113657.		DOI:10.1016/j.jim.2024.113657.
22	Wu B, Chung S, Jiang X-R., McNally J., Pedras-Vasconcelos J., Pillutla R, White J. T., Xu Y., Gupta S. Strategies to determine assay. format for the assessment of neutralizing antibody responses to biotherapeutics. <i>The AAPS journal</i> , 2016, vol. 18, no. 6, pp. 1335-50.		DOI:10.1208/s12248-016-9954-6.
23	Wu B.W., Gunn III G.R. Shankar G. Competitive Ligand-Binding Assays for the Detection of Neutralizing Antibodies. <i>Detection and quantification of antibodies to biopharmaceuticals: practical and applied considerations. Detection and Quantification of Antibodies to Biopharmaceuticals</i> , 2011, pp. 175-192.		DOI:10.1002/9781118075685.ch10.

24	Wu B., Schnarr M., Devlin J. L., Brown S., Yang T-Y. Approaches to improve drug tolerance and target tolerance in the assessment of neutralizing anti-drug antibodies. <i>Bioanalysis</i> , 2019, vol. 11, no. 22, pp. 2061-2074.		DOI:10.4155/bio-2019-0184.
25	Xiang Y., Parng C., Olson K., Seletskaja E., Gorovits B., Jani D., Caiazzo T. , Joyce A. , Donley J. Neutralizing antibody assay development with high drug and target tolerance to support clinical development of an anti-TFPI therapeutic monoclonal antibody. <i>The AAPS Journal</i> , 2019, vol. 21 no. 3, pp. 1-10.		DOI: 10.1208/s12248-019-0320-3.
26	Zoghbi J., Xu Y., Grabert R., Theobald V., Richards S. A breakthrough novel method to resolve the drug and target interference problem in immunogenicity assays. <i>J Immunol Methods</i> , 2015, no.426, pp. 62-69.		DOI: 10.1016/j.jim.2015.08.002.