**КОНЦЕПЦИЯ РАСТВОРИМЫХ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ**

РЕЦЕПТОРОВ ПРИ

Минеев В. Н. ¹,
Нёма М. А. ¹,
Сорокина Л. Н. ¹,
Павлова А. С. ¹,
Муркина Р. Г. ¹

¹ Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Министерства здравоохранения России

CONCEPT OF SOLUBLE RECEPTORS IN BRONCHIAL ASTHMA

Mineev V. N. ^a,
Nyoma M. A. ^a,
Sorokina L. N. ^a,
Pavlova A. S. ^a,
Murkina R. G. ^a

^a First Saint-Petersburg State Medical University named after academician I.P. Pavlov of Health Ministry of Russia

Резюме

Особенности функционирования растворимых рецепторов, главным образом, растворимых цитокиновых рецепторов, находятся в поле зрения исследователей, начиная с последнего десятилетия XX века. Интерес аллергологов, к проблеме растворимых рецепторов связан с тем, что при изучении патогенеза бронхиальной астмы (БА) разрабатываются направления, связанные с исследованиями эктопических хемосенсорных сигнальных систем, в частности, эктопических вкусовых рецепторов к горькому вкусу Tas2R, а также с исследованиями путей сигнализации рецептора конечных продуктов гликирования (Receptor for Advanced Glycation Endproducts – RAGE. В обоих исследованиях изучали при БА экспрессию растворимых рецепторов. В статье обсуждаются механизмы образования растворимых рецепторов: 1) протеолитическое расщепление существующего мембранного рецептора, 2) синтез и высвобождение растворимого рецептора, лишённого трансмембранного домена, посредством альтернативного сплайсинга мРНК, 3) высвобождение мембранных рецепторов в экзосомах. Рассматриваются возможные функциональные эффекты растворимых рецепторов: нейтрализация соответствующих лигандов (рецепторы-ловушки), перенос лигандов, стабилизация лигандов, связывание мембранных белков. Результаты исследований растворимых рецепторов в норме и патологии в некоторых случаях противоречивы и до конца не поняты. С другой стороны, растворимые рецепторы могут представлять собой перспективные терапевтические средства. Полученные нами ранее данные о возможной функции ряда растворимых рецепторов: Tas2R38, Tas2R31, Tas2R5 при исследовании больных с бронхиальной астмой рассматриваются с уже известных позиций функционирования растворимых рецепторов. Наиболее важными общими характеристиками изученных нами растворимых рецепторов при БА являются: 1) низкие плазменные уровни всех обсуждаемых Tas2R при аллергическом варианте бронхиальной астмы по сравнению с неаллергическим вариантом заболевания; 2) корреляционный анализ выявил обратную корреляционную связь плазменных уровней рецепторов Tas2R с показателями, характеризующими бронхиальную проходимость; 3) выявлена корреляционная связь Tas2R с моноцитарно-макрофагальными клетками, с клетками гранулоцитарного ряда, а также с реснитчатыми клетками бронхов. Судя по данным литературы и собственным данным, регулирующая роль растворимых форм рецепторов, участвующих в патогенезе бронхиальной астмы, прежде всего, цитокинов, а также sTas2R и sRAGE может рассматриваться сквозь призму функций соответствующих мембранных рецепторов. В этом случае растворимым формам рецепторов отводится роль белков-ловушек, блокирующих клеточные функции, опосредуемые мембранными рецепторами. При таком подходе при БА обсуждаемые растворимые рецепторы цитокинов и sRAGE оказывают положительный регуляторный эффект, а sTas2R – негативный. Учёт при БА баланса функций растворимых и мембраносвязанных рецепторов клеток, участвующих в

патогенезе заболевания, особенно важен при разработке потенциально новой таргетной терапии бронхиальной астмы, где мишенью являются рецепторы Tas2R и RAGE.

Ключевые слова: бронхиальная астма; растворимые рецепторы; цитокины; эктопические вкусовые рецепторы; рецепторы конечных продуктов гликирования; sTas2R; sRAGE.

Abstract

The functioning of soluble receptors, mainly soluble cytokine receptors, has been of interest to researchers since the last decade of the 20th century. Allergists' interest in the problem of soluble receptors is related to our research into the pathogenesis of bronchial asthma (BA), specifically the development of ectopic chemosensory signaling systems, including ectopic bitter taste receptors Tas2R, and signaling pathways of the Receptor for Advanced Glycation Endproducts (RAGE). The expression of soluble receptors in BA was investigated in both studies. The article discusses the mechanisms of soluble receptor formation: 1) proteolytic cleavage of existing membrane receptors, 2) synthesis and release of soluble receptors lacking a transmembrane domain via alternative mRNA splicing, 3) release of membrane receptors in exosomes. Possible functional effects of soluble receptors are considered: neutralization of corresponding ligands (decoy receptors), ligand transport, ligand stabilization, and binding of membrane proteins. The results of studies of soluble receptors in health and disease are sometimes contradictory and not fully understood. Soluble receptors may represent promising therapeutic agents. Our previous data on the possible function of a number of soluble receptors: Tas2R38, Tas2R31, Tas2R5 in the study of patients with asthma are considered from the already known positions of the soluble receptors functioning. The most important characteristics of the soluble receptors studied in BA are: 1) lower plasma levels of all discussed Tas2Rs in allergic asthma compared to non-allergic; 2) inverse correlation between plasma Tas2R levels and bronchial resistance; 3) correlation of Tas2Rs with monocyte-macrophage cells, granulocytes and bronchial ciliated cells. The regulatory role of soluble receptors involved in asthma pathogenesis, mainly cytokines, as well as sTas2R and sRAGE, can be viewed through the corresponding membrane receptor functions. In this case, soluble forms of receptors play the role of decoy proteins that block functions mediated by membrane receptors. In this approach, in BA, the discussed soluble cytokine receptors and sRAGE have a positive regulatory effect, while sTas2R have a negative one. The balance of soluble and membrane-bound receptor functions in cells involved in asthma pathogenesis is crucial for developing potentially new targeted therapies for asthma, where Tas2R and RAGE receptors are the target.

Keywords: bronchial asthma, soluble receptors, cytokines, ectopic taste receptors, soluble receptor for advanced glycation-end products, sTas2R; sRAGE.

1 “...на самом деле природой давно созданы
2 антицитокиновые механизмы контроля
3 и четко организована тонкая регуляция
4 любого возможного увеличения концентрации в тканях.
5 Уже локально в местах синтеза и действия цитокинов
6 клетки-мишени продуцируют особый тип
7 специфических рецепторов,
8 связывающих молекулы цитокинов
9 и блокирующих их биологическую активность” [1]

10 1 Введение

11 Наш интерес, астмологов, аллергологов, к проблеме так называемых
12 растворимых рецепторов связан с тем, что разрабатываемые в настоящее
13 время направления изучения патогенеза бронхиальной астмы (БА) связаны с
14 исследованиями эктопических хемосенсорных сигнальных систем, в
15 частности, эктопических вкусовых рецепторов к горькому вкусу Tas2R [2, 3,
16 4], а также с исследованиями путей сигнализации рецептора конечных
17 продуктов гликирования (Receptor for Advanced Glycation Endproducts –
18 RAGE) [5]. При этом важно, что в обоих исследованиях изучали при БА
19 уровни растворимых (свободных, плазменных) рецепторов.

20 Особенности функционирования растворимых рецепторов, главным
21 образом, растворимых цитокиновых рецепторов, находятся в поле зрения
22 исследователей, начиная с последнего десятилетия XX века, когда появилось
23 сообщение о растворимом рецепторе к IL-2 [6]. За время, прошедшее с тех пор,
24 было открыто множество растворимых рецепторов к цитокинам, а также был
25 проведен целый ряд исследований, как молекулярных механизмов
26 образования этих рецепторов [7], так и механизмов их функционирования в
27 норме и патологии [8, 9, 10].

28 Подчеркнем, что аналогичных исследований, касающихся растворимых
29 рецепторов Tas2R, в доступной литературе не найдено, а и исследования
30 sRAGE при БА немногочисленны [11].

31 Начнем с обсуждения механизмов образования растворимых
32 рецепторов. Существуют, как известно, три основных механизма [9]: 1)
33 *протеолитическое расщепление* существующего мембранного рецептора, 2)
34 синтез и высвобождение растворимого рецептора, лишенного
35 трансмембранного домена, посредством *альтернативного сплайсинга мРНК*,
36 3) высвобождение мембранных рецепторов во внеклеточных везикулах, таких
37 как *экзосомы*.

38 Интересно, что большинство растворимых рецепторов образуются
39 посредством нескольких механизмов, хотя часто в разных соотношениях.

40 Помимо рецепторов, растворимые формы корецепторов могут также
41 образовываться с помощью тех же процессов [9].

42 Стоит отметить, что растворимые рецепторы обладают аналогичной
43 аффинностью, что и их мембрано-связанные рецепторы.

44 Согласно данным литературы [9], выделяют в основном пять возможных
45 функциональных эффекта растворимых рецепторов (таблица 1).

46 Рассмотрим первую наиболее хорошо изученную функцию
47 растворимых рецепторов - это связывание и нейтрализация их лигандов,
48 действуя как рецепторы-ловушки. В этом случае связывание лиганда с
49 растворимым рецептором препятствует связыванию лиганда с рецептором
50 клеточной мембраны, снижая доступность лигандов для классической
51 передачи сигналов с помощью мембранных рецепторов.

52 Если нейтрализующий растворимый рецептор образуется путем
53 отщепления от мембранной формы, то возникает двойной негативный эффект
54 на передачу сигналов цитокинов, поскольку отщепление рецептора приводит
55 к высвобождению нейтрализующего рецептора-ловушки и прекращению
56 передачи сигналов цитокинов.

57 Растворимые рецепторы, действующие как рецепторы-ловушки, были
58 идентифицированы в каждом семействе рецепторов.

59 На рисунке 1 приведена схема, иллюстрирующая один из основных
60 возможных механизмов (протеолиз) образования растворимых рецепторов и
61 их основной возможный функциональный эффект (рецепторы ловушки) на
62 примере двух изучаемых нами растворимых рецепторов (sTas2R и sRAGE).

63 Е.Кefaloyianni (2022) [9] в качестве примеров приводит данные, о том,
64 что растворимые TNFR1 и TNFR2 могут связывать TNF *in vitro* и *in vivo* и
65 ингибировать его последующие сигнальные функции [13].

66 Рекомбинантный sIL-5Ra [14] способен связывать IL-5 и ингибировать
67 свои пролиферативные эффекты в эозинофилах *in vitro*, что предполагает, что
68 природный sIL-5Ra имеет аналогичные функции. Также [15] растворимая
69 форма рецептора ST2 связывается со своим лигандом IL-33, ингибируя его
70 функцию *in vitro* и *in vivo*, понижая его кардиозащитное действие.

71 Свойства рецепторов-ловушек не ограничиваются растворимыми
72 цитокиновыми рецепторами, а также распространяются и на растворимые
73 корецепторы, однако большинство корецепторов обладают низкой или
74 нулевой способностью связывать лиганд, и их функции в качестве ловушек
75 требуют дополнительного взаимодействия с мембранными или растворимыми
76 формами рецепторов [9].

77 Что касается второй функции растворимых рецепторов - лиганд-
78 транспортной функции, то в этом случае связывание растворимого рецептора
79 с лигандом может обеспечить “доставку” лиганда к определенной мишени,
80 которая не может связывать лиганд самостоятельно или не может связывать
81 его с высокой эффективностью.

82 Типичным примером является связывание комплекса IL-6/растворимый
83 IL-6R с корецептором gp130 на поверхности клеток [18]. Хотя IL-6R в
84 основном экспрессируется в иммунных клетках, корецептор gp130 широко
85 экспрессируется. Коррецептор gp130 не обладает способностью связывать IL-
86 6, и клетки, не экспрессирующие IL-6R, не реагируют на IL-6. Однако, когда
87 IL-6 связан с растворимым IL-6R, комплекс может связываться с gp130 на

88 поверхности клеток, которые не экспрессируют IL-6R, и сделать таким
89 образом их чувствительными к IL-6 (процесс трансигнализации).

90 Именно этот процесс трансигнализации обсуждается, наряду с
91 классическим, при развитии системного воспаления при хронической
92 обструктивной болезни легких [24].

93 Следующая функция ряда растворимых рецепторов - это стабилизация
94 своих лигандов, увеличивающая их биодоступность, вызывая при этом
95 агонистический эффект.

96 Так, подобная функция обсуждается [9], в частности, для растворимых
97 рецепторов TNFR1 и TNFR2. Было показано, что биологическая активность
98 TNF может спонтанно снижаться, в основном из-за распада активных
99 тримеров на неактивные мономеры. В то время как высокие концентрации
100 растворимых TNFR1/2 могут нейтрализовать и ингибировать TNF, действуя
101 как рецепторы-ловушки, низкие концентрации, как было показано [19],
102 стабилизируют его тримерную форму, что приводит к продлению
103 биологической активности TNF.

104 Этот пример подчеркивает [9] критическое влияние относительных
105 концентраций лигандов и растворимых рецепторов в локальном
106 микроокружении или в кровотоке и предполагает, что растворимые рецепторы
107 могут выполнять различные функции *локально* (высокие концентрации) и
108 *системно* (низкие концентрации).

109 Обсуждается [9] аналогичный механизм, который, по-видимому,
110 существует для sIL-4R, который, как известно, блокирует секрецию IgE,
111 нейтрализуя эндогенный IL-4 (функция рецептора-ловушки), но также
112 усиливает, *в зависимости от дозы*, биологические эффекты экзогенно
113 вводимого IL-4, предположительно, изменяя биораспределение цитокина
114 (функция стабилизации).

115 Аналогичные результаты были также получены для sIL-7R, который
116 ингибирует функцию IL-7 *in vitro* посредством связывания и нейтрализации
117 цитокина [16].

118 Напротив, рекомбинантный sIL-7R-Fc усиливал IL-7-опосредованные
119 эффекты *in vitro* и *in vivo*, что предполагает агонистический эффект.
120 Последнее можно объяснить [20] тем, что комплекс IL7/sIL-7R снижает IL-7R-
121 опосредованную интернализацию IL-7, когда цитокин ограничен, что в
122 конечном итоге увеличивает биоактивность IL-7.

123 Весьма интересной представляется функция растворимых рецепторов –
124 функция их связывания с мембранными формами лигандов (так называемая
125 обратная передача сигнала). Примером является обратная передача сигнала
126 TNF. В этом случае TNF синтезируется как трансмембранный белок, который
127 экспрессируется на поверхности клетки. Растворимые рецепторы TNF
128 (TNFR), связываясь с мембранным TNF, инициируют сигнальные события в
129 клетке, экспрессирующей TNF.

130 Таким образом, лиганд TNF действует как “рецептор”, а рецептор TNFR
131 действует как “лиганд”. что известно как “обратная передача сигнала”.

132 Обратная сигнализация TNF в моноцитах приводит к устойчивости к
133 воспалительным агентам, таким как LPS [22].

134 Как было отмечено выше, в экзосомах может осуществляться перенос
135 растворимых рецепторов между различными типами клеток, ибо одно из
136 свойств экзосом заключается в их способности сливаться с клетками,
137 обеспечивая перенос своего содержимого в другую клетку или тип клеток. Это
138 предполагает потенциальную возможность переноса рецептора в клетку-
139 мишень, которая обычно не экспрессирует этот рецептор. Циркулирующие
140 экзосомы и их содержимое могут доставляться в органы, удаленные от места
141 их образования.

142 Примером такого межорганного взаимодействия является один из EGFR
143 (epidermal growth factor receptor), высвобождаемый в экзосомах клетками рака
144 желудка, доставляемый и интегрируемый в плазматическую мембрану
145 стромальных клеток печени, способствуя метастазированию в печень [23].

146 Таким образом, нами кратко рассмотрены принципиальные механизмы
147 образования и функционирования растворимых рецепторов.

148 В целом, некоторые растворимые рецепторы действуют как антагонисты
149 и функционируют как растворимые рецепторы-ловушки, которые
150 конкурируют с мембранными рецепторами за связывание с лигандом и, таким
151 образом, инактивируют цитокин после связывания, так и агонистически при
152 связывании со своим лигандом и, таким образом, способны активировать
153 клетки, у которых отсутствует соответствующий рецептор на клеточной
154 поверхности и которые обычно вообще не реагируют на цитокин.

155 Некоторые растворимые рецепторы способны осуществлять обе
156 функции в зависимости от биологического контекста, и что, вероятно, также
157 важно, от *стехиометрии мембраносвязанных и растворимых рецепторов* [25].

158 Ключевыми детерминантами функций растворимых рецепторов
159 являются также их *соотношение локальных и системных уровней*, хотя все эти
160 параметры в большинстве случаев остаются неизвестными [9].

161 Более подробно молекулярные механизмы образования растворимых
162 цитокиновых рецепторов и их биологические функции для такого важного
163 семейства цитокинов, как так называемые “Th2 цитокины” (таблица 2) в
164 патологии, в частности, при бронхиальной астме, рассмотрены в обзоре [10].

165 Несмотря на то, что результаты исследований растворимых рецепторов
166 в норме и патологии в некоторых случаях противоречивы и до конца не
167 поняты [9], необходимо отметить, что растворимые рецепторы могут
168 представлять собой, как перспективные маркеры заболеваний, так и
169 терапевтические средства.

170 Считается [9], что, благодаря своей растворимости и способности
171 циркулировать в крови, их можно легко и неинвазивно измерять в образцах
172 пациентов, получая информацию о тяжести, прогрессировании или ремиссии
173 заболевания. Как нейтрализующие факторы, они обладают высокой
174 специфичностью, связываются со своими мишенями с высоким сродством и

175 могут быть подвергнуты дальнейшей инженерной модификации для усиления
176 их биологической активности или корректировки их связывающих свойств.

177 Благодаря этим характеристикам, попытки использовать растворимые
178 рецепторы в качестве маркеров заболеваний и лекарств начались уже в
179 середине 80-х годов, вскоре после открытия первых растворимых рецепторов
180 [Kefaloyianni E].

181 В этом отношении представляет интерес обзор, сделанный еще в конце
182 XX века (1998) [8]. Так, авторы полагают, что растворимые рецепторы играют
183 важную роль в развитии заболеваний у человека, во многих случаях являясь,
184 по-видимому, неотъемлемой частью динамического взаимодействия между
185 лигандами и их мембраносвязанными рецепторами в поддержании и
186 восстановлении здоровья после патологического воздействия.

187 С другой стороны, в некоторых случаях нарушенная регуляция
188 экспрессии растворимых рецепторов может способствовать патологии
189 заболевания, что приводит к пониманию необходимости искать пути
190 терапевтического применения, в частности, на основе их действия в качестве
191 ингибиторов действия цитокинов.

192 Авторы [8] полагают, что, хотя ранние клинические испытания
193 растворимых рецепторов выявили неожиданные токсические эффекты, вполне
194 вероятно, что растворимые рецепторы присоединятся к гормонам, цитокинам
195 и факторам роста в качестве признанных методов биологической терапии.

196 Что касается данных литературы относительно растворимых рецепторов
197 как биомаркеров, растворимые рецепторы всех семейств цитокинов были
198 обнаружены в повышенных или пониженных концентрациях в сыворотке
199 крови (или других биологических жидкостях) при различных заболеваниях
200 [9].

201 Список конкретных примеров постоянно растет. E.Kefaloyianni (2022)
202 [9] приводит целый ряд примеров.

203 Так, уровень сывороточного IL-2Ra повышен у пациентов с различными
204 онкологическими диагнозами [26] и при рассеянном склерозе [27]. Уровень
205 сывороточного sIL-4R повышен при остеоартрите [28], бронхиальной астме
206 [29].

207 Уровень растворимого IL-5Ra повышен в сыворотке крови пациентов с
208 эозинофилией или мастоцитозом [30].

209 Растворимый ST2 является перспективным новым биомаркером для
210 сердечно-сосудистых заболеваний [31].

211 Уровни TNFR1 и TNFR2 повышены при хронической болезни почек
212 различного генеза и коррелируют с тяжестью заболевания и
213 неблагоприятными исходами, включая сердечно-сосудистые заболевания и
214 смертность, у этих пациентов [32].

215 В ряде случаев уровни рецепторов в сыворотке крови не только
216 коррелируют с наличием или тяжестью заболевания, но и предсказывают
217 прогрессирование заболевания. В последнем случае растворимые рецепторы

218 могут использоваться в качестве прогностических маркеров прогрессирования
219 заболевания.

220 Одним из примеров является прогностическая ценность уровней TNFR1
221 и TNFR2 в сыворотке крови при диабетической нефропатии. У пациентов с
222 диабетом 1 или 2 типа с более высокими циркулирующими уровнями был
223 значительно более высокий риск прогрессирования заболевания [33].

224 Практически важным аспектом изучения растворимых рецепторов
225 является возможность их терапевтического применения при ряде заболеваний
226 в качестве антицитокиновой терапии [8, 9, 10].

227 Так, одним из известных примеров, упоминающихся в литературе,
228 является применение растворимого цитокинового рецептора TNF α при целом
229 ряде ревматологических заболеваний (анкилозирующем спондилоартрите,
230 псориазе, псориатическом артрите). Речь идет о препарате этанерцепт,
231 который, в частности, с успехом применяли отечественные исследователи [34]
232 при лечении ревматоидного артрита.

233 Роль растворимого рецептора к конечным продуктам гликирования
234 (RAGE) класса J [35] при бронхиальной астме в качестве рецептора-ловушки
235 рассмотрена нами ранее [5].

236 В последние годы внимание астмологов привлекает патогенетическая
237 роль при бронхиальной астме так называемых эктопических (выявляемых вне
238 их канонических локализаций) нейросенсорных рецепторов – вкусовых
239 рецепторов к горькому вкусу [2], эктопических обонятельных [36] и
240 фоторецепторов [37]. Все эти рецепторы объединяет сигнализация,
241 сопряженная с G-белком (GPCR).

242 К сожалению, данных об указанных эктопических растворимых
243 рецепторах в доступной литературе не найдено. Тем не менее, нами получены
244 данные при исследовании больных с бронхиальной астмой о ряде
245 растворимых вкусовых рецепторов: Tas2R38 [2], Tas2R31 [3], Tas2R5 [4].

246 Наиболее важными общими характеристиками этих растворимых
247 (плазменных, свободных) рецепторов при бронхиальной астме согласно
248 полученным нами данным [2, 3, 4] являются: 1) низкие плазменные уровни
249 всех обсуждаемых Tas2R при аллергическом варианте бронхиальной астмы по
250 сравнению с неаллергическим вариантом заболевания; 2) корреляционный
251 анализ выявил обратную корреляционную связь плазменных уровней
252 рецепторов Tas2R с показателями, характеризующими бронхиальную
253 проходимость; 3) выявлена корреляционная связь Tas2R с моноцитарно-
254 макрофагальными клетками, с клетками гранулоцитарного ряда
255 (нейтрофилами, эозинофилами, базофилами), а также с эпителиальными
256 клетками бронхов.

257 Можно предположить, что растворимые рецепторы Tas2R (sTas2R), как
258 и растворимые рецепторы цитокинов, обладают свойствами рецепторов-
259 ловушек в тех сигнальных системах, которые опосредуют рецепторы Tas2R в
260 соответствующих клеточных системах (гладкомышечные клетки бронхов,
261 клетки воспаления).

262 Действительно, в подобном случае, учитывая характер корреляционной
263 связи рецепторов Tas2R с показателями, характеризующими бронхиальную
264 проходимость, а также с клеточными субпопуляциями, вполне логично
265 допустить, что эффектом функционирования sTas2R при БА будет негативная
266 регуляция, как бронхиальной проходимости, так и тех патогенетических
267 клеточных механизмов, которые опосредуются активацией мембранных
268 рецепторов Tas2R, в частности, IgE-зависимое высвобождение медиаторов
269 воспаления из тучных клеток [38], ингибирование пролиферации и
270 контрактильности гладкомышечных клеток бронхов, приводящая к
271 ремоделированию и гиперреактивности [39], ингибирование липосахарид-
272 индуцированного высвобождения лейкоцитами TNF- α , IL-13, MCP-1 и других
273 цитокинов [40].

274 Что касается патогенетической роли RAGE, то полагают, что RAGE
275 играет жизненно важную роль в качестве ключевого медиатора в патогенезе
276 бронхиальной астмы, включая аллергическое воспаление, гиперреактивность,
277 бронхоконстрикцию, ремоделирование бронхов [41]. При этом рецепторы
278 sRAGE рассматриваются как рецепторы-ловушки [41].

279 Таким образом, судя по данным литературы и собственным данным,
280 регулирующая роль растворимых форм рецепторов, участвующих в
281 патогенезе бронхиальной астмы, прежде всего, цитокинов, а также sTas2R и
282 sRAGE, может рассматриваться сквозь призму функций соответствующих
283 мембранных рецепторов. В этом случае растворимым формам рецепторов
284 отводится роль белков-ловушек, блокирующих клеточные функции,
285 опосредуемые мембранными рецепторами.

286 Таким образом, при БА обсуждаемые растворимые рецепторы
287 цитокинов и sRAGE оказывают положительный регуляторный эффект, а
288 sTas2R – негативный (рисунок 2).

289 Если рассматривать функцию sRAGE и sTas2R рецепторов с позиции
290 других известных функций растворимых рецепторов, в частности,
291 агонистической по отношению к мембранному рецептору, то необходимо
292 учитывать и то, что растворимые рецепторы могут осуществлять обе функции
293 (антагониста и агониста) в зависимости от биологического контекста [12], и
294 необходимо учитывать также и стехиометрию мембраносвязанных и
295 растворимых рецепторов [25].

296 Именно эта задача ставится нами при изучении сигнальных систем при
297 БА, связанных с sRAGE и sTas2R, представленных практически во всех
298 клетках, участвующих в аллергическом воспалении при бронхиальной астме.

299 Решение этой задачи позволит получить дополнительно
300 принципиальные данные для осмысления регулирующей роли этих
301 сигнальных систем.

302 Необходимо отметить, что заслуживает большого внимания монография
303 В.В.Новикова (2022) [42], в которой подводится итог многолетней работы по
304 изучению регуляторной роли в иммунном ответе растворимых
305 дифференцировочных молекул клеток иммунной системы при целом ряде

306 воспалительных процессов (аллергических заболеваниях, болезни легких,
307 псориазе и других). Весьма интересны представления автора [42] о «шторме»
308 растворимых дифференцировочных молекул при тяжелом течении COVID-19.

309 Подводя итог, следует подчеркнуть, что стержневым фактором
310 концепции растворимых рецепторов является их активный регуляторный
311 характер, как в норме, так и в патологии, а направленность влияния зависит от
312 целого ряда условий: конкретного типа клетки, специфики лиганда и самих
313 рецепторов, стехиометрии растворимых и мембраносвязанных рецепторов,
314 клеточного микроокружения, а также от специфики и активности
315 патологического процесса.

316 Дальнейшая разработка концепции должна учитывать как
317 диагностическую (биомаркер), прогностическую так и возможную лечебную
318 задачи.

319 В качестве заключения следует сказать, что учет при бронхиальной
320 астме баланса функций растворимых и мембраносвязанных рецепторов
321 клеток, участвующих в патогенезе заболевания, особенно важен при
322 разработке потенциально новой таргетной терапии бронхиальной астмы, где
323 мишенью являются рецепторы Tas2R [39] и RAGE [5].

ТАБЛИЦЫ

Таблица 1. Возможные функциональные эффекты растворимых рецепторов.
Table 1. Possible functional effects of soluble receptors.

Могут действовать: May act:	Источники
<p>1. как агенты, нейтрализующие соответствующие лиганды (рецепторы-ловушки)</p> <p>as agents, neutralizing contribute ligands (decoy receptors)</p>	<p>sIL-1R2 [12], sTNFR1, sTNFR2 [13], sIL-5Ra [14], sST2 [15], sIL-7R [12, 16], sIL-13Rα2 [12, 17]</p>
<p>2. как агонисты, которые переносят лиганды (процесс транссигнализации)</p> <p>as agonists, transporting ligands (transsignalisation process)</p>	<p>IL-6/sIL-6/gp130 [12, 18]</p>
<p>3. как стабилизаторы лигандов, увеличивающие биодоступность лигандов, проявляя агонистический эффект (функция стабилизации)</p> <p>as ligands stabilizers, increasing ligands' bioavailability, making agonistic effect (stabilisation function)</p>	<p>Низкие концентрации sTNFR1/2 [19] Рекомбинантный sIL-7R-Fc [20], sIL-4R [21]</p> <p>Low concentrations of sTNFR1/2 [19], Recombinant sIL-7R-Fc [20], sIL-4R [21]</p>
<p>4. как факторы связывания мембранных белков (“обратная передача сигнала”)</p> <p>as factors of membrane proteins binding (“reverse transmission of signal”)</p>	<p>“Обратная сигнализация” TNF [22] “Reverse signalisation” of TNF [22]</p>
<p>5. перенос растворимых рецепторов в экзосомах</p> <p>transport of soluble receptors inside exosomes</p>	<p>sEGFR (epidermal growth factor receptor) [23]</p>

Таблица 2. Растворимые формы некоторых Th2-цитокинов, их функция, механизм образования (модифицировано из [10]).

Table 2. Soluble forms of some Th2 cytokines, their function, mechanism of formation (modified from [10]).

Рецептор цитокина Cytokine receptor	Активация с помощью activation by	Наличие растворимой формы и ее функция Existence of soluble form and its function	Механизм образования Mechanism of formation
IL-5R α	IL-5	Да, антагонист Yes, antagonist	Протеолиз, альтернативный сплайсинг Proteolysis, alternative splicing
общая β -цепь common β -chain	IL-5 (IL-3, GM-CSF)	Нет No	-
IL-4R α	IL-4	Да, не ясна Yes, not clear	Протеолиз, альтернативный сплайсинг Proteolysis, alternative splicing
IL-13R α 1	IL-4, IL-13	Да, Агонист Yes, agonist	Не известен Not known
IL-13R α 2	IL-13	Да, Антагонист Yes, antagonist	Протеолиз, альтернативный сплайсинг Proteolysis, alternative splicing
IL-17RA	IL-25 (IL-17A)	Да, Антагонист Yes, antagonist	Не известен Not known
IL-25R	IL-25 (IL-17B)	Да, Антагонист Yes, antagonist	Альтернативный сплайсинг alternative splicing

РИСУНКИ

Рисунок 1. Один из основных возможных механизмов (протеолиз) образования растворимых рецепторов и их основной возможной функции (рецепторы ловушки) на примере растворимых рецепторов: sTas2R и sRAGE.
Figure 1. One of the main possible mechanisms (proteolysis) of the formation of soluble receptors and their main possible function (decoy receptor) using the example of soluble receptors: sTas2R and sRAGE.

Рисунок 2. Возможные регуляторные эффекты растворимых рецепторов sTas2R и sRAGE при бронхиальной астме.

Figure 2. Possible regulatory effects of soluble sTas2R and sRAGE receptors in bronchial asthma.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ_МЕТАДААННЫЕ

Блок 1. Информация об авторе ответственном за переписку

Минеев Валерий Николаевич – доктор медицинских наук, профессор;
кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии
ПСПбГМУ имени академика И.П. Павлова;
адрес: 197022, Санкт-Петербург, ул Льва Тостого, 6-8;
факс +78123386087;
тел. +79043338567;
e-mail: nyoma1@yandex.ru

Mineev Valeriy Nickolaevich – medical sciences doctor, professor;
philosophy doctor, docent, First Pavlov State Medical University of Saint-
Petersburg, Hospital Therapy department;
address: 197022, Leo Tolstoy street, 6-8, b.10, Saint-Petersburg;
fax +78123386087;
telephone +79043338567;
e-mail: nyoma1@yandex.ru

Блок 2. Информация об авторах

Сорокина Лада Николаевна – доктор медицинских наук, профессор;
Sorokina Lada Nickolaevna - medical sciences doctor, docent;

Нёма Михаил Александрович – кандидат медицинских наук, доцент;
Nyoma Mikhail Alexandrovich - PhD, docent;

Павлова Анастасия Сергеевна – кандидат медицинских наук;
Pavlova Anastasia Sergeevna – PhD, assistant;

Муркина Рахиль Геннадьевна – клинический ординатор;
Murkina Rakhil Gennadievna – clinical Ordinator.

Блок 3. Метаданные статьи

КОНЦЕПЦИЯ РАСТВОРИМЫХ РЕЦЕПТОРОВ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ

CONCEPT OF SOLUBLE RECEPTORS IN BRONCHIAL ASTHMA

Сокращенное название статьи для верхнего колонтитула:

РАСТВОРИМЫЕ РЕЦЕПТОРЫ ПРИ АСТМЕ

SOLUBLE RECEPTORS IN ASTHMA

Ключевые слова: бронхиальная астма; растворимые рецепторы; цитокины; эктопические вкусовые рецепторы; рецепторы конечных продуктов гликирования; sTas2R; sRAGE.

Keywords: bronchial asthma, soluble receptors, cytokines, ectopic taste receptors, soluble receptor for advanced glycation-end products, sTas2R; sRAGE.

Обзоры.

Количество страниц текста – 8,

Количество таблиц – 2,

Количество рисунков – 2.

04.08.2025

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Порядковый номер и ссылки	Авторы, название публикации и источника, где она опубликована, выходные данные	ФИО, название публикации и источника на английском	Полный интернет-адрес (URL) цитируемой статьи или ее doi.
1.	Симбирцев А.С. Иммунофармакологические аспекты системы цитокинов // Бюллетень сибирской медицины. – 2019. – Т.18. - №1. – С.84–95.	Simbirtsev A.S. Immunopharmacological aspects of the cytokine system. <i>Bulletin of Siberian Medicine</i> . 2019, Vol.18,no1, pp. 84–95	https://doi.org/10.20538/1682-0363-2019-1-84–95.
2.	Минеев В.Н., Трофимов В.И., Нёма М.А., Кузикова А.А. Вкусовые рецепторы к горькому вкусу в сыворотке крови при бронхиальной астме (гипотеза) // Пульмонология. – 2017. - Т.27. - №5. - С567-572.	Mineev V.N., Trofimov V.I., Nyoma M.A., Kuzikova A.A. Bitter taste receptors in serum of patients with asthma (a hypothesis). <i>Pulmonologiya</i> . 2017, Vol.27, no5, pp.567-572.	doi.org/10.18093/0869-0189-2017-27-5-567-572.
3.	Минеев В.Н., Нёма М.А., Трофимов В.И. Эктопические вкусовые рецепторы TAS2R31 в сыворотке крови	Mineev V.N., Nyoma M.A., Trofimov V.I. Ectopic taste buds TAS2R31 in blood	doi: 10.34215/1609-1175-2021-1-68-71

	при различных вариантах бронхиальной астмы // Тихоокеанский медицинский журнал. 2021. - №1. – С.68–71.	serum in different types of bronchial asthma. <i>Pacific Medical Journal</i> . 2021, no.1, pp.68–71	
4.	Нёма М.А., Минеев В.Н., Муркина Р.Г., Садовая В.В. Ассоциация плазменных уровней эктопического вкусового рецептора TAS2R5 с клинико-функциональными характеристиками бронхиальной астмы // University Therapeutic Journal. 2025. - Т.7. - №2. – С.84–92.	Nyoma M.A., Mineev V.N., Murkina R.G., Sadovaya V.V. Association of plasma levels of the TAS2R5 ectopic taste receptor with clinical and functional characteristics of bronchial asthma. <i>University Therapeutic Journal</i> . 2025, Vol.7, no2, pp.84–92.	doi: doi.org/10.56871/UTJ.2025.77.75.007
5.	Сорокина Л.Н., Минеев В.Н., Павлова А.С., Трофимов В.И. Роль рецептора к конечным продуктам гликирования (RAGE) в патогенезе бронхиальной астмы // Пульмонология. 2025. – Т.35. - №1. – С.95–101.	Sorokina L.N., Mineev V.N., Pavlova A.S., Trofimov V.I. The role of the receptor for advanced glycation endproducts (RAGE) in the pathogenesis of asthma. <i>Pul'monologiya</i> , 2025, Vol.35, no1, pp.95–101	doi: 10.18093/0869-0189-2025-35-1-95-101

6.	Rubin L.A., Kurman C.C., Fritz M.E., Biddison W.E., Boutin B., Yarchoan R., Nelson, D. L. Soluble interleukin 2 receptors are released from activated human lymphoid cells in vitro. J. Immunol. 1985, no.135, pp.3172–3177.	-	-
7.	Levine S.J. Molecular mechanisms of soluble cytokine receptor generation. J. Biol. Chem. 2008, Vol.283, no.21, pp.14177-14181.	-	doi: 10.1074/jbc.R700052200
8.	Heaney M.L., Golde D.W. Soluble receptors in human disease. J. Leukoc. Biol. 1998, Vol.64, no.2, pp.135-146	-	doi: 10.1002/jlb.64.2.135.
9.	Kefaloyianni E. Soluble forms of cytokine and growth factor receptors: mechanisms of generation and modes of action in the regulation of local and systemic inflammation. FEBS Lett. 2022, Vol.596, no.5, pp.589-606.	-	doi: 10.1002/1873-3468.14305

10.	Lokau J., Garbers C. Biological functions and therapeutic opportunities of soluble cytokine receptors. <i>Cytokine Growth Factor Rev.</i> 2020, Vol.55, no.4, pp.94-108.	-	doi: 10.1016/j.cytogfr.2020.04.003
11.	Минеев В.Н., Сорокина Л.Н. Феномен гликирования белков при бронхиальной астме // Университетский терапевтический вестник. 2023. – Т.5. - №4. – С.73–81.	Mineev V.N., Sorokina L.N. Protein glycation phenomenon in bronchial asthma. <i>University therapeutic journal (St. Petersburg).</i> 2023, Vol.5, no.4, pp.73-81.	doi.org/10.56871/UTJ.2023.73.75.006
12.	Кетлинский, С. А. Цитокины. / С. А. Кетлинский, А. С. Симбирцев. — СПб : Фолиант, 2008. — 552 с.	Ketlinsky, S. A. Cytokines. / S. A. Ketlinsky, A. S. Simbirtsev. - St. Petersburg: Foliant, 2008. - 552 p.	-
13.	Mohler K.M., Torrance D.S., Smith C.A., Goodwin R.G., Stremmer K.E., Fung V.P., Madani H., Widmer M.B. Soluble tumor necrosis factor	-	-

	(TNF) receptors are effective therapeutic agents in lethal endotoxemia and function simultaneously as both TNF carriers and TNF antagonists. J. Immunol. 1993, Vol.151, no.3, pp.1548-1561.		
14.	Cameron L., Christodoulouopoulos P., Lavigne F., Nakamura Y., Eidelman D., McEuen A., Walls A., Tavernier J., Minshall E., Moqbel R., Hamid Q. Evidence for local eosinophil differentiation within allergic nasal mucosa: inhibition with soluble IL-5 receptor. J. Immunol. 2000, Vol.164, no.3, pp.1538-1545.	-	doi: 10.4049/jimmunol.164.3.1538
15.	Hayakawa H., Hayakawa M., Kume A., Tominaga S. Soluble ST2 blocks interleukin-33 signaling in allergic airway inflammation. J. Biol. Chem. 2007, Vol.282, no.36, pp.26369-26380	-	. doi: 10.1074/jbc.M704916200

16.	Crawley A.M., Faucher S., Angel J.B. Soluble IL-7R alpha (sCD127) inhibits IL-7 activity and is increased in HIV infection. <i>J. Immunol.</i> 2010, Vol.184, no.9, pp.4679-4687	-	. doi: 10.4049/jimmunol.0903758
17.	Минеев В.Н., Сорокина Л.Н., Трофимов В.И., Нёма М.А., Иванов В.А. Рецепторы к интерлейкину-4 и -13: строение, функция и генетический полиморфизм // Пульмонология. 2010. - №3. – С.113-119.	Mineev V.N., Sorokina L.N., Trofimov V.I., Nema M.A., Ivanov V.A. Interleukin-4 and -13 receptors: structure, function, and genetic polymorphism. <i>Pulmonology.</i> 2010, no.3, pp.113-119.	https://doi.org/10.18093/0869-0189-2010-3-113-119
18.	Schumertl T., Lokau J., Rose-John S., Garbers C. Function and proteolytic generation of the soluble interleukin-6 receptor in health and disease. <i>Biochim. Biophys. Acta Mol. Cell Res.</i> 2022, Vol.1869, no.1, p.119143.	-	doi: 10.1016/j.bbamcr.2021.119143
19.	Aderka D., Engelmann H., Maor Y., Brakebusch C., Wallach D. Stabilization of the	-	doi: 10.1084/jem.175.2.323

	bioactivity of tumor necrosis factor by its soluble receptors. J. Exp. Med. 1992, Vol.175, no.2, pp.323-329.		
20.	Lundström W., Highfill S., Walsh S.T., Beq S., Morse E., Kockum I., Alfredsson L., Olsson T., Hillert J., Mackall C.L. Soluble IL7R α potentiates IL-7 bioactivity and promotes autoimmunity. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A. 2013, Vol.110, no.19, pp.E1761-1770.	-	doi: 10.1073/pnas.1222303110
21.	Sato T.A., Widmer M.B., Finkelman F.D., Madani H., Jacobs C.A., Grabstein K.H., Maliszewski C.R. Recombinant soluble murine IL-4 receptor can -inhibit or enhance IgE responses in vivo. J. Immunol. 1993, Vol.150, no.7, pp.2717-2723.	-	
22.	Eissner G., Kirchner S., Lindner H., Kolch W., Janosch P., Grell	-	doi: 10.4049/jimmunol.164.12.6193

	M., Scheurich P., Andreesen R., Holler E. Reverse signaling through transmembrane TNF confers resistance to lipopolysaccharide in human monocytes and macrophages. <i>J. Immunol.</i> 2000, Vol.164, no.12, pp.6193-6198.		
23.	Zhang H., Deng T., Liu R., Bai M., Zhou L., Wang X., Li S., Wang X., Yang H., Li J., Ning T., Huang D., Li H., Zhang L., Ying G., Ba Y. Exosome-delivered EGFR regulates liver microenvironment to promote gastric cancer liver metastasis. <i>Nat. Commun.</i> 2017, Vol.8, p.15016.	-	doi: 10.1038/ncomms15016
24.	Виткина Т. И., Сидлецкая К. А. Роль интерлейкин-6 сигналинга в развитии системного воспаления при хронической обструктивной болезни легких // Бюллетень физиологии и патологии	Vitkina T.I., Sidletskaia K.A. The role of interleukin-6 signaling in development of systemic inflammation in chronic obstructive pulmonary disease. <i>Bulletin</i>	doi: doi.org/10.12737/article_5b9858ead1b5e3.93619630

	дыхания. 2018. - №69. – С.97-106.	<i>Physiology and Pathology of Respiration.</i> 2018, no.69, pp.97-106.	
25.	Mantovani A., Locati M., Vecchi A., Sozzani S., Allavena P. Decoy receptors: a strategy to regulate inflammatory cytokines and chemokines. Trends Immunol. 2001, Vol.22, no.6, pp.328-336.	-	doi: 10.1016/s1471-4906(01)01941-x
26.	Bien E., Balcerska A. Serum soluble interleukin 2 receptor alpha in human cancer of adults and children: a review. Biomarkers. 2008, Vol.13, no.1, pp.1-26	-	doi: 10.1080/13547500701674063.
27.	Maier L.M., Anderson D.E., Severson C.A., Baecher-Allan C., Healy B., Liu DV., Wittrup K.D., De Jager P.L., Hafler D.A. Soluble IL-2RA levels in multiple sclerosis subjects and the effect of soluble IL-2RA on immune responses. J. Immunol.	-	doi: 10.4049/jimmunol.182.3.1541

	2009, Vol.182, no.3, pp.1541-1547.		
28.	Silvestri T., Pulsatelli L., Dolzani P., Facchini A., Meliconi R. Elevated serum levels of soluble interleukin-4 receptor in osteoarthritis. <i>Osteoarthritis Cartilage</i> . 2006, Vol.14, no.7, pp.717-719.	-	doi: 10.1016/j.joca.2006.02.015
29.	Hytönen A.M., Löwhagen O., Arvidsson M., Balder B., Björk A.L., Lindgren S., Hahn-Zoric M., Hanson L.A., Padyukov L. Haplotypes of the interleukin-4 receptor alpha chain gene associate with susceptibility to and severity of atopic asthma. <i>Clin. Exp. Allergy</i> . 2004, Vol.34, no.10, pp.1570-1575.	-	doi: 10.1111/j.1365-2222.2004.02069.x
30.	Wilson T.M., Maric I., Shukla J., Brown M., Santos C., Simakova O., Khoury P., Fay M.P., Kozhich A., Kolbeck R., Metcalfe D.D., Klion A.D. IL-5 receptor α levels in patients with	-	doi: 10.1016/j.jaci.2011.05.032

	marked eosinophilia or mastocytosis. J. Allergy Clin. Immunol. 2011, Vol. 128, no.5, pp.1086-92.e1-3.		
31.	Vallejo-Vaz A.J. Novel Biomarkers in Heart Failure Beyond Natriuretic Peptides - The Case for Soluble ST2. Eur. Cardiol. 2015, Vol.10, no.1, pp.37-41.	-	doi: 10.15420/ecr.2015.10.01.37
32.	Bae E., Cha R.H., Kim Y.C., An J.N., Kim D.K., Yoo K.D., Lee S.M., Kim M.H., Park J.T., Kang S.W., Park J.Y., Lim C.S., Kim Y.S., Yang S.H., Lee J.P. Circulating TNF receptors predict cardiovascular disease in patients with chronic kidney disease. Medicine (Baltimore). 2017, Vol.96, no.19, p.e6666.	-	doi: 10.1097/MD.0000000000006666
33.	Gohda T., Niewczas M.A., Ficociello L.H., Walker W.H., Skupien J., Rosetti F., Cullere X., Johnson A.C., Crabtree G., Smiles A.M., Mayadas T.N.,	-	doi: 10.1681/ASN.2011060628

	Warram J.H., Krolewski A.S. Circulating TNF receptors 1 and 2 predict stage 3 CKD in type 1 diabetes. <i>J. Am. Soc. Nephrol.</i> 2012, Vol.23, no.3, pp.516-524.		
34.	Сигидин Я.А., Лукина Г.В. . Препарат этанерцептв современной ревматологии // Научно-практическая ревматология. 2010. –Т.48. - №3. – С.78-82.	Sigidin Ya.A., Lukina G.V. Preparat etanertseptv sovremennoy revmatologii. <i>Rheumatology Science and Practice.</i> 2010, Vol.48, no.3, pp.78-82.	doi.org/10.14412/1995-4484-2010-447
35.	Гусев Е.Ю., Зотова Н.В., Журавлева Ю.А., Черешнев В.А. Физиологическая и патогенетическая роль рецепторов-мусорщиков у человека // Медицинская иммунология. 2020. – Т.22. - №1. - С.7–48.	Gusev E.Yu., Zotova N.V., Zhuravleva Yu.A., Chereshev V.A. Physiological and pathogenic role of scavenger receptors in humans. <i>Medical Immunology (Russia)/Meditinskaya Immunologiya,</i> 2020, Vol. 22, no. 1, pp. 7-48.	doi: 10.15789/1563-0625-PAP-1893

36.	Минеев В.Н. Эктопические обонятельные рецепторы в респираторной системе // Пульмонология. 2019. Т.29. - №6. – С.734-738	Mineev V.N. Ectopic olfactory receptors in the respiratory system. <i>Pulmonologiya</i> . 2019, Vol.29, no.6, pp.734-738.	doi.org/10.18093/0869-0189-2019-29-6-734-738
37.	Минеев В.Н. Эктопические фоторецепторы при бронхиальной астме: возможная патогенетическая роль // Иммунопатология, аллергология, инфектология. 2020. - №2. – С.34-40.	Mineev V.N. Ectopic photoreceptors in bronchial asthma: possible pathogenetic role. <i>Immunopathology, allergology, infectology</i> 2020, no.2, pp.34-40.	doi: 10.14427/jipai.2020.2.34
38.	Ekoff M., Choi J.H., James A., Dahlén B., Nilsson G., Dahlén S.E. Bitter taste receptor (TAS2R) agonists inhibit IgE-dependent mast cell activation. <i>J. Allergy Clin. Immunol.</i> 2014, Vol.134, no.2, pp.475-478.	-	doi: 10.1016/j.jaci.2014.02.029
39.	Tong A., Yang H., Yu X., Wang D, Guan J., Zhao M., Li J. Mechanisms and novel therapeutic roles of bitter taste receptors in diseases.	-	doi: 10.7150/thno.107406

	Theranostics. 2025, Vol.15, no.9, pp.3961-3978.		
40.	Orsmark-Pietras C., James A., Konradsen J.R., Nordlund B., Söderhäll C., Pulkkinen V., Pedroletti C., Daham K., Kupczyk M., Dahlén B., Kere J., Dahlén S.E., Hedlin G., Melén E. Transcriptome analysis reveals upregulation of bitter taste receptors in severe asthmatics. Eur. Respir. J. 2013, Vol.42, no.1, pp.65-78.	-	doi: 10.1183/09031936.00077712
41.	Milutinovic P.S., Alcorn J.F., Englert J.M., Crum L.T., Oury T.D. The receptor for advanced glycation end products is a central mediator of asthma pathogenesis. Am. J. Pathol. 2012, Vol.181, no.4, pp.1215-25	-	. doi: 10.1016/j.ajpath.2012.06.031
42.	Новиков В.В. Растворимые дифференцировочные молекулы при воспалительных процессах	Novikov V.V. Soluble Differentiation Molecules in Inflammatory Processes	-

	(Вторая жизнь белков): монография / Новиков В.В. - Нижний Новгород: Гладкова О.В. "Издательский салон", 2022. - 212 с.	(The Second Life of Proteins): Monograph / Novikov V.V. - Nizhny Novgorod: Gladkova O.V. "Publishing Salon", 2022. - 212 p.	
--	--	---	--