ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ИНДУКЦИИ НАРУШЕНИЙ РЕГУЛЯЦИИ АНГИОГЕНЕЗА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА

Коненков В.И., Шевченко А.В., Прокофьев В.Ф.,
Климонтон В.В., Королев М.А., Фазулина О.Н.,
Лапсина С.А., Королева Е.А.

ФГБУ НИИ клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН, г. Новосибирск

Резюме. В статье приводятся результаты изучения распределения генотипов генов регуляторов ангиогенеза *MMP* и *VEGF* и их комбинаций с генотипами других цитокинов с проангиогенной активностью среди больных сахарным диабетом 2 типа и здоровых лиц. Показано, что у больных преобладают комбинации генотипов индукторов ангиогенеза *MMP2-MMP9-VEGF*, обеспечивающих нестабильный баланс соотношения активационных и депрессивных сигналов, связанные с наличием как аллелей *C* гена *VEGF* и гена *MMP2*, так и с наличием аллеля *C* гена *MMP9*. В состав комбинированных генетических признаков, частота которых изменена у больных, наряду с генотипами *MMP* и *VEGF*, наиболее часто входят генотипы *IL-1B*, *IL-4*, *IL-10*, *IL-6* и *TNFA*. Предполагается, что для изучения патогенеза развития сахарного диабета 2 типа необходимо комплексное исследование роли генов факторов регуляции ангиогенеза и воспаления с акцентом на молекулярно-генетические механизмы контроля базового уровня продукции данных регуляторных факторов.

Ключевые слова: матриксные металлопротеиназы, *VEGF*, цитокины, генный полиморфизм, сахарный диабет 2 типа.

Konenkov V.I., Shevchenko A.V., Prokofev V.F., Klimontov V.V., Korolev M.A., Fazulina O.N., Lapsina S.A., Koroleva E.A.

GENETIC FACTORS INDUCING DISTURBED REGULATION OF ANGIOGENESIS IN DIABETES MELLITUS TYPE 2

Abstract. The article includes results of studying frequency distributions of polymorphic genotypes for some genes regulating angiogenesis, i.e., *MMP* and *VEGF*, and their combinations with genotypes of some cytokines showing pro-angiogenic activity in patients with diabetes mellitus type 2 (DM2) and healthy controls. Angiogenesis-inducing *MMP2-MMP9-VEGF* genotype constellations have been shown to be more common in DM patients, thus presumably causing an imbalance between activation and suppression signals, being connected with *C* alleles of *VEGF* and *MMP2*, as well as with harboring of *MMP9 C* allele. Certain genotypes of *IL-1B*, *IL-4*, *IL-10*, *IL-6*, and *TNFA*, along with *MMP* and *VEGF* variants are more common within combined genetic patterns in DM patients. It is suggested that allelic combination studies of angiogenesis- and inflammation-regulating genes are necessary for understanding the DM2 pathogenesis, taking into account genetic control mechanisms influencing basic production levels of these regulatory factors. (*Med. Immunol.*, 2012, vol. 14, N 6, pp 489-500)

Адрес для переписки:

Прокофьев Виктор Федорович, к.м.н., в.н.с. лаборатории клинической иммуногенетики, ФГБУ НИИ клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН
630117, г. Новосибирск, ул. Академика Тимакова, 2.
Тел.: (383) 227-01-94.
Факс: (383) 227-01-96.
E-mail: vprok@ngs.ru

Keywords: matrix metalloproteinases, *VEGF*, cytokines, gene polymorphism, diabetes mellitus type 2.

Введение

Сосудистые нарушения при сахарном диабете 2 типа (СД2) являются основной причиной тяжелых нефропатий, диабетических ретинопатий, диа-

бетических микроангиопатий нижних конечностей. Эти клинические проявления нарушений ангиогенеза являются основной причиной инвалидности и смертности пациентов с СД2. При развитии всех этих клинически разнообразных, но патогенетически сходных состояний, развивается порочный круг нарушений ангиогенеза, приводящий к самоподдержанию и хроническому прогрессированию ишемических процессов с последующей гипоксией и развитием склеротических процессов. Ишемия вызывает гиперпродукцию целого ряда биологических агентов, среди которых значимое место занимают матричные металлопротеиназы (ММР), являющиеся мощными индукторами продукции факторов роста сосудистого эндотелия (VEGF), стромального фактора-1 (SDF-1), фактора роста пигментного эпителия (PEDF) и т. п., баланс которых и определяет состояние сосудистого русла в тканях [5].

В поисках способов коррекции сосудистых нарушений у пациентов с СД2, необходимо не только ясно представлять себе взаимодействие многочисленных факторов регуляции ангиогенеза и васкулогенеза, но и оценить базовый уровень их продукции у каждого пациента. На этом пути предстоят значительные сложности, связанные как с недостатками наших знаний о сложном каскаде взаимодействия многочисленных гуморальных регуляторных факторов, так с чрезвычайной вариабельностью их концентраций в биологических жидкостях. Последнее связано с целым рядом причин: принадлежность этих молекул к короткодистантным клеточным регуляторам, короткий срок жизни этих макромолекул во внеклеточной среде, наличие системы естественных агонистов и антагонистов, слабая устойчивость белковых макромолекул к воздействию эндогенных протеаз, низкая концентрация в биологических жидкостях на пределе порога чувствительности современных методов детекции и т.п.

Учитывая эти объективные трудности, нам представляется перспективным на современном этапе использовать данные о том, что базовый уровень продукции каждого из потенциальных регуляторов ангиогенеза во многом зависит от аллельного варианта регуляторных участков промоторных зон соответствующих генов и является конституционно присущим и относительно стабильным у каждого человека на протяжении его жизни [4].

Регуляция экспрессии *MMP2* и *MMP9* происходит, прежде всего, на транскрипционном уровне, в промоторном регионе гена, и зависит от влияния эндотелиальных факторов роста и цитокинов [12]. Выявлен функциональный полиморфизм *MMP9* C/T в области промотора в позиции

-1562, причем наличие в генотипе минорного аллеля *T* обеспечивает высокую транскрипционную активность гена [15]. В промоторном регионе *MMP2* выявлено несколько полиморфных сайтов и показано, что замена *MMP 2* C/T в позиции -1306 носит функциональный характер, причем аллельный вариант *C* ассоциирован с высокой промоторной активностью [14].

Фактор роста эндотелия сосудов — семейство структурно близких между собой белков, которые, совместно с рецепторами (VEGFR), играют существенную роль в развитии и регуляции деятельности кровеносных и лимфатических сосудов. Известно, однонуклеотидные замены в промоторном регионе генов *VEGF-A*, *VEGF-B*, *VEGF-C* оказывают определенное влияние на уровень продукции белков. Аллели -2578C, -1154G и -634C ассоциированы с высоким уровнем экспрессии *VEGF-A*. *VEGF* SNP полиморфизм в позициях -2578 и -1154, расположенных в пределах промоторного региона, влияет на синтез VEGF-A стимулированными периферийными мононуклеарами [10]. Генотип *VEGF* -634CC связан с более высокой сывороточной концентрацией VEGF у здоровых лиц и с повышенной VEGF продукцией мононуклеаров, стимулированных липополисахаридами по сравнению с *CG* и *GG* генотипами [8]. В 3'-нетранслируемом регионе гена выявлена полиморфная позиция в положении +936, влияющая на уровень VEGF в плазме крови. Плазменные уровни VEGF у носителей *VEGF* +936 *T* снижены [13].

Исходя из этого, целью данной работы было исследование генетической структуры пациентов с СД2 и здоровых лиц с акцентом на распределение комбинированных генотипов, включающих в себя гены таких известных регуляторов ангиогенеза, как гены *MMP* и гены *VEGF*. Наряду с этим анализировалось и наличие в ассоциированных с СД2 генетических комбинациях, вариантов генов цитокинов с проангиогенной активностью.

Материалы и методы

В исследование включена группа из 586 жителей России женского пола, считающих себя и своих родителей русскими, в том числе 374 женщины без нарушений углеводного обмена, в возрасте от 23 до 68 лет, и 212 пациенток с СД2, в возрасте от 28 до 69 лет. Диагноз СД устанавливался по критериям ВОЗ (1999 г.). У больных с верифицированным СД определялась гликемия натощак и после еды, а также уровень гликированного гемоглобина *A1c*. При необходимости проводилось исследование С-пептида, антител к глутаматдекарбоксилазе и антиостровковых антител, для исключения латентного аутоиммунного диабета взрослых. В исследование не вклю-

чались пациенты с эндокринопатиями, болезнями экзокринной части поджелудочной железы и другими факторами риска симптоматических форм СД.

Обследованные давали письменное информированное согласие на участие в исследовании. Протокол исследования одобрен локальным этическим комитетом.

Исследовался однонуклеотидный полиморфизм (SNP - single nucleotide polymorphism) промоторного региона генов *TNFA* -863 СА, *TNFA* -308 GА, *TNFA* -238 GА, *IL-1β* -31 СТ, *IL-4* -590 СТ, *IL-6* -174 GС, *IL-10* -1082 G А и *IL-10* -592 АС, *VEGF* -2578 СА, *VEGF* +936 СТ, *MMP2* -1306 СТ, *MMP9* -1562 СТ. Генотипирование осуществляли методом рестриктоного анализа продуктов амплификации (RFLP) [4, 7, 9, 11].

При статистическом анализе результатов исследований использовали такие показатели как частота встречаемости генов, генотипов и их комбинаций, специфичность (Sp), отношение шансов (OR) с расчетом 95% доверительного интервала (95%CI). Частоту аллелей генов цитокинов вычисляли методом прямого подсчета. Распределение генотипов по исследованным полиморфным локусам проверяли на соответствие равновесию Харди–Вайнберга [1]. Достоверность различий частот распределения изучаемых признаков в альтернативных группах определяли по критерию χ^2 с поправкой Йетса на непрерывность и двустороннему варианту точного метода Фишера для четырехпольных таблиц как описано ранее [2].

Результаты

Результаты проведенного исследования показали, что в контрольной выборке и в выборке больных наблюдаемое распределение генотипов всех изученных полиморфных вариантов генов регуляторов ангиогенеза соответствовало каноническому распределению Харди–Вайнберга.

Частоты встречаемости комбинированных генетических признаков, включающих в себя генотипы *MMP2*, *MMP9* и *VEGF*, в группах пациентов с СД2 и с его отсутствием, различаются существенным образом. Всего среди проанализированных частот генетических комбинаций по всей группе обследованных лиц выявлено 968 генетических комбинаций, достоверно различающихся с уровнем значимости $p < 0,05$ по двустороннему критерию точного метода Фишера. В целях исключения слабо достоверных данных был задан минимальный уровень значимости различий по данному критерию ($p < 0,005$), что привело к сокращению числа анализируемых признаков до 142. Показатели отношения шансов для этих признаков укладывались в интервал 95%CI. Из этого

общего числа высоко достоверно различающихся признаков, частота 45 из них была значительно повышена среди пациентов с СД2 (позитивная ассоциация), а частота встречаемости 97 из них оказалась сниженной (негативная ассоциация) относительно соответствующих показателей здоровых лиц.

Анализ состава генотипов, входящих в состав генетических комбинированных признаков, позитивно ассоциированных с развитием СД2 (табл. 1), показал, что в большинстве случаев (97,8%) в их состав входят варианты гена *VEGF*, содержащие в своем составе аллели С в обеих полиморфных позициях +963 и -2578, обеспечивающие высокий уровень продукции проангиогенного фактора роста сосудистого эндотелия у этих лиц. При этом в 75% случаев эти генотипы представлены гомозиготными вариантами СС.

Показано наличие в составе генетических комбинаций, часто встречающихся при СД2, генотипов *MMP9*. Среди них также выявлено преобладание гомозиготных генотипов СС, однако эти аллели С, как указывалось выше, ассоциируются с более низким уровнем продукции данного фермента. Генотипы *MMP2* встречаются относительно редко, всего в 20 % случаев, однако также представлены, в основном, гомозиготными вариантами СС, обеспечивающими высокий уровень продукции желатиназы А у обладателей этого генотипа. Исходя из этого можно предположить, что среди пациентов с СД2 преобладают сложные генотипы индукторов ангиогенеза *MMP2-MMP9-VEGF*, обеспечивающих нестабильный баланс соотношения активационных и депрессивных сигналов, связанные с наличием как аллелей С гена *VEGF* и гена *MMP2*, так и с наличием аллеля С гена *MMP9*.

Рассматривая наличие в позитивно ассоциированных с СД2 генетических комбинаций аллелей других цитокинов с потенциально проангиогенной активностью, обращает на себя внимание широкое представительство генотипов *TNFA* во всех исследованных полиморфных позициях -238, -308 и -863. Среди этих генотипов также преобладают гомозиготные варианты GG или СС, связанные с низким уровнем продукции самого фактора некроза опухолей-α. Наличие аллелей А в составе этих генотипов значительно ниже и соотносится как 1:7.

Генотипы других цитокинов, с явной провоспалительной и проангиогенной активностью (*IL-1β* и *IL-6*), в основном, представлены гомозиготными вариантами TT и GG, соответственно, в полиморфных позициях -31 Т/С и -174 G/С, связанными с высоким уровнем продукции интерлейкина-1β и интерлейкина-6.

ТАБЛИЦА 1. КОМБИНИРОВАННЫЕ ГЕНОТИПЫ VEGF И MMP, АССОЦИИРОВАННЫЕ С ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ К РАЗВИТИЮ СД2

Полиморфизмы	Комбинации генотипов	СД2	ЗД	OR	OR 95%CI	P(t _m F ₂)	Sp
VEGF-936:MMP9-1562:TNF-863:TNF-308:IL-6-174:IL-10-592	CC-CC-CC-GA-GG-CC	5,24	0,00	28,07	1,64-479,3	0,0002	100,00
VEGF-936:MMP9-1562:TNF-863:TNF-308:TNF-238:IL-6-174:IL-10-592	CC-CC-CC-GA-GG-GG-CC	5,24	0,00	27,27	1,60-465,6	0,0002	100,00
VEGF2578:MMP9-1562:IL-1B-31:IL-4-590:IL-10-592	CA-CC-CC-CC-CC	3,47	0,00	21,14	1,20-372,3	0,0023	100,00
VEGF2578:VEGF-936:MMP9-1562:IL-1B-31:IL-4-590:IL-10-592	CA-CC-CC-CC-CC-CC	3,47	0,00	18,68	1,06-329,1	0,0037	100,00
VEGF2578:MMP2-1306:TNF-863:TNF-308:IL-6-174:IL-10-592	CA-CC-CC-GG-GG-CA	3,90	0,00	18,64	1,07-324,9	0,0029	100,00
VEGF-936:MMP9-1562:TNF-308:IL-4-590:IL-6-174	CC-CC-GA-CT-GG	3,40	0,00	18,53	1,05-326,5	0,0039	100,00
VEGF-936:MMP9-1562:TNF-308:IL-4-590:IL-6-174	CC-CT-GA-CC-GC	3,40	0,00	18,53	1,05-326,5	0,0039	100,00
VEGF-936:MMP9-1562:TNF-863:TNF-308:IL-4-590:IL-6-174	CC-CC-CC-GA-CT-GG	3,40	0,00	18,53	1,05-326,5	0,0039	100,00
VEGF-936:MMP9-1562:TNF-863:IL-10-1082	CC-CC-CA-AA	6,60	0,00	18,04	1,07-305,1	0,0028	100,00
VEGF2578:MMP2-1306:TNF-863:TNF-308:TNF-238:IL-6-174:IL-10-592	CA-CC-CC-GG-GG-GG-CA	3,90	0,00	18,03	1,03-314,5	0,0034	100,00
VEGF-936:MMP9-1562:TNF-308:TNF-238:IL-4-590:IL-6-174	CC-CC-GA-GG-CT-GG	3,40	0,00	18,01	1,02-317,2	0,0043	100,00
VEGF-936:MMP9-1562:TNF-863:TNF-308:TNF-238:IL-4-590:IL-6-174	CC-CC-CC-GA-GG-CT-GG	3,40	0,00	18,01	1,02-317,2	0,0043	100,00
VEGF2578:VEGF-936:MMP2-1306:IL-4-590:IL-10-1082	CA-CC-CC-CC-AA	7,00	0,00	17,49	1,03-296,1	0,0028	100,00
VEGF2578:VEGF-936:MMP2-1306:TNF-238:IL-4-590:IL-10-1082	CA-CC-CC-GG-CC-AA	7,00	0,00	17,49	1,03-296,1	0,0028	100,00
VEGF-936:MMP9-1562:TNF-308:IL-6-174:IL-10-592	CC-CC-GA-GG-CC	5,71	0,41	14,67	1,89-113,7	0,0009	99,59
VEGF-936:MMP9-1562:TNF-308:TNF-238:IL-6-174:IL-10-592	CC-CC-GA-GG-GG-CC	5,71	0,42	14,24	1,84-110,5	0,0010	99,58
VEGF2578:MMP2-1306:TNF-863:IL-1B-31:IL-10-592	AA-CC-CC-TT-CC	5,37	0,47	12,02	1,54-93,97	0,0026	99,53
VEGF2578:VEGF-936:MMP9-1562:TNF-308:IL-10-1082	CA-CC-CC-GG-AA	10,53	1,64	7,06	1,63-30,57	0,0018	98,36
VEGF2578:VEGF-936:MMP9-1562:TNF-308:TNF-238:IL-10-1082	CA-CC-CC-GG-GG-AA	10,53	1,64	7,06	1,63-30,57	0,0018	98,36
VEGF-936:MMP9-1562:TNF-308:IL-4-590	CC-CT-GA-CC	5,34	0,79	7,05	1,54-32,18	0,0041	99,21
VEGF2578:VEGF-936:MMP9-1562:IL-4-590:IL-10-1082	CA-CC-CC-CC-AA	10,34	1,64	6,92	1,59-30,07	0,0029	98,36
VEGF2578:VEGF-936:MMP9-1562:TNF-238:IL-4-590:IL-10-1082	CA-CC-CC-GG-CC-AA	10,34	1,64	6,92	1,59-30,07	0,0029	98,36
VEGF2578:MMP2-1306:TNF-238:IL-1B-31:IL-6-174	CA-CC-GG-TT-GG	6,31	0,97	6,90	1,54-30,99	0,0035	99,03

Таблица 1 (окончание)

Полиморфизмы	Комбинации генотипов	СД2	ЗД	OR	OR 95%CI	P(tnF ₂)	Sp
VEGF2578:MMP9-1562:IL-10-1082:IL-10-592	CA-CC-AA-CC	9,62	1,57	6,65	1,53-28,95	0,0028	98,43
VEGF2578:VEGF-936:MMP2-1306:IL-10-1082	CA-CC-CC-AA	10,68	1,79	6,58	1,52-28,51	0,0032	98,21
VEGF2578:VEGF-936:MMP9-1562:IL-10-1082	CA-CC-CC-AA	13,88	2,46	6,39	1,90-21,45	0,0004	97,54
VEGF2578:VEGF-936:MMP9-1562:TNF-238:IL-10-1082	CA-CC-CC-GG-AA	13,88	2,46	6,39	1,90-21,45	0,0004	97,54
VEGF2578:MMP9-1562:TNF-238:IL-10-1082:IL-10-592	CA-CC-GG-AA-CC	9,13	1,57	6,28	1,44-27,45	0,0047	98,43
VEGF2578:MMP9-1562:TNF-308:IL-10-1082	CA-CC-GG-AA	12,92	2,34	6,18	1,84-20,82	0,0006	97,66
VEGF2578:MMP9-1562:TNF-308:TNF-238:IL-10-1082	CA-CC-GG-GG-AA	12,44	2,34	5,92	1,75-19,98	0,0010	97,66
VEGF2578:MMP9-1562:IL-4-590:IL-10-1082	CA-CC-CC-AA	11,82	2,34	5,59	1,65-18,96	0,0017	97,66
VEGF2578:MMP9-1562:TNF-238:IL-4-590:IL-10-1082	CA-CC-GG-CC-AA	11,82	2,34	5,59	1,65-18,96	0,0017	97,66
VEGF2578:MMP9-1562:IL-10-1082	CA-CC-AA	18,18	3,91	5,47	2,09-14,29	0,0001	96,09
VEGF2578:MMP9-1562:TNF-238:IL-10-1082	CA-CC-GG-AA	17,70	3,91	5,29	2,02-13,85	0,0001	96,09
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:IL-10-1082	CC-CC-CC-AA	12,44	2,68	5,16	1,53-17,46	0,0035	97,32
VEGF-936:MMP2-1306:TNF-238:IL-4-590	CC-TT-GG-CC	9,36	2,01	5,03	1,68-15,08	0,0020	97,99
VEGF2578:MMP9-1562:TNF-863:IL-10-1082	CA-CC-CC-AA	12,44	3,13	4,40	1,50-12,93	0,0029	96,88
VEGF2578:MMP9-1562:TNF-863:TNF-238:IL-10-1082	CA-CC-CC-GG-AA	11,96	3,13	4,21	1,43-12,40	0,0046	96,88
VEGF-936:MMP9-1562:TNF-308:IL-10-1082	CC-CC-GG-AA	17,45	4,88	4,12	1,69-10,08	0,0006	95,12
VEGF-936:MMP9-1562:TNF-308:IL-4-590:IL-10-1082	CC-CC-GG-CC-AA	14,08	4,07	3,87	1,46-10,27	0,0044	95,93
VEGF-936:MMP9-1562:IL-4-590:IL-10-1082	CC-CC-CC-AA	15,53	4,88	3,59	1,45-8,85	0,0038	95,12
VEGF-936:MMP9-1562:TNF-308:TNF-238:IL-10-1082	CC-CC-GG-GG-AA	15,57	4,88	3,59	1,46-8,85	0,0026	95,12
VEGF-936:MMP9-1562:IL-10-1082	CC-CC-AA	21,70	7,32	3,51	1,65-7,45	0,0006	92,68
VEGF-936:MMP9-1562:TNF-238:IL-10-1082	CC-CC-GG-AA	19,81	7,32	3,13	1,47-6,68	0,0024	92,68
VEGF-936:MMP2-1306:IL-10-1082	CC-CC-AA	20,10	7,96	2,91	1,36-6,22	0,0039	92,04

Примечание. Здесь и в таблице 2: СД2 – частота встречаемости комбинаций генотипов у больных СД2 в %; ЗД – частота встречаемости комбинаций генотипов у здоровых женщин в %; OR – отношение шансов; OR 95%CI – 95%-й доверительный интервал для OR; P(tnF₂) – значения P разности частот встречаемости комбинаций генотипов в группах сравнения по двустороннему варианту точного метода Фишера; Sp – специфичность в %.

Помимо генов цитокинов с проангиогенной активностью, в составе, позитивно ассоциированных с СД2, генотипов выявлены и гены с противоангиогенной активностью *IL-4* и *IL-10*. Так, генотипы *IL-4*, выявляющиеся в 37,7% случаев, все содержат аллель *C* в гомозиготном *CC* варианте или, реже, в гетерозиготном варианте *CT*. Аллель *C*, как известно, ассоциируется со сниженной способностью продуцировать интерлейкин-4. Сходные данные установлены и для аллельного полиморфизма гена *IL-10*. В 60% случаев среди позитивно ассоциированных с СД2 генетических комбинаций выявляются гомозиготные генотипы *AA* в полиморфной позиции этого гена -1082 *A/G*, ассоциированные с низкой способностью клеток лиц с таким генотипом продуцировать интерлейкин-10. С другой стороны, среди всех позитивно ассоциированных признаков, в 24,4% случаев выявлены генотипы, содержащие аллель *C* в полиморфной позиции *IL-10-592 A/C*, связанные с высокой продукцией этого цитокина. Здесь же необходимо отметить, что, как правило, в составе одной генетической комбинации генотипы в этих двух полиморфных позициях не выявляются.

При анализе состава генетических комбинаций, негативно ассоциированных с развитием СД2, т.е. тех комбинаций, частота которых достоверно снижена в группе пациентов, по сравнению со здоровыми лицами, выявляются другие закономерности (табл. 2). Данные по частотам встречаемости генотипов *VEGF* оказались близки к результатам по группе позитивно ассоциированных комбинаций. Здесь также преобладают генотипы, содержащие аллель *C*, в основном, в гомозиготном варианте *CC* в обеих полиморфных позициях +963 *C/T* и -2578 *A/C*. В отличие данных таблицы 1, в этой группе генетических признаков практически во всех случаях выявляются аллели гена *MMP2* в позиции -1306, содержащие аллели *C* и гораздо реже (39,2%) выявляются генотипы *MMP9* с тем же преобладанием аллелей *C*.

В большинстве комбинированных генетических признаков, негативно ассоциированных с развитием СД2 также выявлено наличие генотипов *TNFA*, содержащих, в основном, аллели *C* и *G*. В отличие от предыдущей группы признаков, в данной группе крайне редко представлены гомозиготные варианты генов *IL-1B* и *IL-6*, ассоциированные с определенным влиянием на уровень продукции соответствующих макромолекул.

В частоте встречаемости генотипов цитокинов с противовоспалительной и противоангиогенной активностью также установлены существенные различия. В отличие от сравниваемой группы, среди этих комбинированных генетических признаков значительно реже выявляются генотипы

IL-4, среди которых наличие гомозиготных комбинаций *CC* оставляет всего 25%. Еще большие различия установлены для гена *IL-10*. Гомозиготные комбинации *AA* в позиции -1082 *A/G*, широко представленные в группе позитивно ассоциированных генетических признаков, в данной группе полностью отсутствуют и в 100% случаев представлены гетерозиготными комбинациями *AG*. В противоположность этому, среди генотипов этого гена в позиции -592 *A/C* преобладают гомозиготные генотипы *CC*, способствующие высокому уровню продукции интерлейкина-10.

Подводя итоги выявленных различий, представленных в таблице 3, можно отметить, что между двумя этими группами лиц, подверженных и устойчивых к развитию СД2, установлены разнонаправленные изменения в характере распределения комбинированных генетических признаков по качественному их составу. Так, отмечается полное отсутствие среди лиц, предрасположенных к развитию заболевания генотипа *CT VEGF +963*, который широко представлен среди здоровых лиц и выявляется в составе каждого десятого генетического признака. Более того, 100%-е представительство генотипа *AC VEGF -2578* в составе генетических комбинаций, позитивно ассоциированных с развитием СД2, в оппозиционной группе сменяется относительно равномерным представительством генотипов *CC* и *AC*. То же отмечается и для гена *MMP2* в позиции -1306, когда 90%-е представительство генотипа *CC* в одной группе, сменяется преобладанием представительства генотипа *CT*. Равномерное представительство генотипов *GG* и *AG* гена *TNFA* в позиции -308, в позитивно ассоциированной группе признаком, сменяется 100% преобладанием гомозиготного генотипа *GG* в оппозиционной группе признаков. Аналогичное заключение можно сделать и для генотипа *CC* гена *TNFA* в позиции -863. Еще большие различия выявляются при анализе характера распределения генотипов цитокинов с проангиогенной и противоангиогенной активностью, входящих в состав *VEGF - MMP*-ассоциированных генетических комбинированных признаков. Равномерное распределение гомозиготных генотипов *CC* и *TT* гена *IL-1B* в группе лиц, предрасположенных к развитию заболевания, сменяется на практически полное доминирование гетерозиготного генотипа *CT* в оппозиционной группе. Выявляется инверсия равномерного соотношения генотипов *CC* и *CT* гена *IL-4* в позиции -590 на преобладание гетерозиготного генотипа *CT*. Если в группе позитивно ассоциированных с СД2 генетических комбинаций преобладает гомозиготный вариант *GG* гена *IL-6* в позиции -174, то среди негативно ассоци-

ТАБЛИЦА 2. КОМБИНИРОВАННЫЕ ГЕНОТИПЫ VEGF И MMP, АССОЦИИРОВАННЫЕ С УСТОЙЧИВОСТЬЮ К РАЗВИТИЮ СД2

Полиморфизмы	Комбинации генотипов	СД2	ЗД	OR	OR 95%CI	P (tmF ₂)	Sp
VEGF2578:VEGF-936:MMP2-1306:IL-1B-31:IL-10-1082	CC-CC-TC-TC-AG	0,00	6,42	0,03	0,00-0,59	0,0005	100,00
VEGF2578:VEGF-936:MMP2-1306:TNF-238:IL-1B-31:IL-10-1082	CC-CC-TC-GG-TC-AG	0,00	6,42	0,03	0,00-0,59	0,0005	100,00
VEGF-936:MMP2-1306:IL-6-174:IL-10-1082:IL-10-592	CC-TC-GC-AG-CA	0,00	5,31	0,04	0,00-0,71	0,0018	100,00
VEGF2578:VEGF-936:MMP2-1306:TNF-308:IL-1B-31:IL-10-1082	CC-CC-TC-GG-TC-AG	0,00	5,50	0,04	0,00-0,69	0,0016	100,00
VEGF2578:VEGF-936:MMP2-1306:IL-1B-31:IL-10-1082:IL-10-592	CC-CC-TC-TC-AG-CC	0,00	5,50	0,04	0,00-0,69	0,0016	100,00
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:IL-6-174:IL-10-1082:IL-10-592	CC-TC-CC-GC-AG-CA	0,00	5,36	0,04	0,00-0,71	0,0017	100,00
VEGF-936:MMP2-1306:TNF-308:IL-6-174:IL-10-1082:IL-10-592	CC-TC-GG-GC-AG-CA	0,00	5,31	0,04	0,00-0,71	0,0018	100,00
VEGF2578:VEGF-936:MMP2-1306:TNF-308:TNF-238:IL-1B-31:IL-10-1082	CC-CC-TC-GG-GG-TC-AG	0,00	5,50	0,04	0,00-0,69	0,0016	100,00
VEGF2578:VEGF-936:MMP2-1306:TNF-238:IL-1B-31:IL-10-1082:IL-10-592	CC-CC-TC-GG-TC-AG-CC	0,00	5,50	0,04	0,00-0,69	0,0016	100,00
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-308:IL-6-174:IL-10-1082:IL-10-592	CC-TC-CC-GG-GC-AG-CA	0,00	5,36	0,04	0,00-0,71	0,0017	100,00
VEGF-936:MMP9-1562:TNF-863:TNF-308:TNF-238:IL-1B-31:IL-4-590	CC-CC-CC-GG-GG-TC-CT	0,00	5,00	0,04	0,00-0,75	0,0006	100,00
VEGF2578:VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:IL-10-1082:IL-10-592	CA-CC-TC-CC-AG-CA	0,00	4,50	0,05	0,00-0,86	0,0050	100,00
VEGF2578:VEGF-936:MMP2-1306:TNF-308:IL-4-590:IL-6-174	CA-CT-CC-GG-CC-GC	0,00	4,48	0,05	0,00-0,87	0,0036	100,00
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-863:IL-6-174:IL-10-1082	CT-CC-CC-CC-GC-AG	0,00	4,46	0,05	0,00-0,85	0,0049	100,00
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:IL-1B-31:IL-10-1082:IL-10-592	CC-TC-CC-TT-AG-CA	0,00	4,59	0,05	0,00-0,84	0,0046	100,00
VEGF-936:MMP2-1306:TNF-863:TNF-308:IL-6-174:IL-10-1082	CT-CC-CC-GG-GC-AG	0,00	4,42	0,05	0,00-0,86	0,0050	100,00
VEGF-936:MMP2-1306:TNF-238:IL-1B-31:IL-10-1082:IL-10-592	CC-TC-GG-TT-AG-CA	0,00	4,55	0,05	0,00-0,84	0,0047	100,00
VEGF2578:VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-308:IL-10-1082:IL-10-592	CA-CC-TC-CC-GG-AG-CA	0,00	4,50	0,05	0,00-0,86	0,0050	100,00
VEGF2578:VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-238:IL-10-1082:IL-10-592	CA-CC-TC-CC-GG-AG-CA	0,00	4,50	0,05	0,00-0,86	0,0050	100,00
VEGF2578:VEGF-936:MMP2-1306:TNF-308:IL-1B-31:IL-10-1082:IL-10-592	CC-CC-TC-CC-GG-TC-AG-CC	0,00	4,59	0,05	0,00-0,84	0,0047	100,00
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-863:TNF-308:IL-1B-31:IL-4-590	CC-CC-CC-CC-GG-TC-CT	0,00	4,06	0,05	0,00-0,96	0,0032	100,00
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-863:TNF-308:IL-6-174:IL-10-1082	CT-CC-CC-CC-GG-GC-AG	0,00	4,46	0,05	0,00-0,85	0,0049	100,00
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-238:IL-1B-31:IL-10-1082:IL-10-592	CC-TC-CC-GG-TT-AG-CA	0,00	4,59	0,05	0,00-0,84	0,0046	100,00
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-238:IL-6-174:IL-10-1082:IL-10-592	CC-TC-CC-GG-GC-AG-CA	0,00	4,46	0,05	0,00-0,86	0,0050	100,00
VEGF2578:VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-308:TNF-238:IL-10-1082:IL-10-592	CA-CC-TC-CC-GG-AG-CA	0,00	4,50	0,05	0,00-0,86	0,0050	100,00
VEGF2578:VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-238:IL-10-1082:IL-10-592	CC-CC-TC-CC-GG-AG-CA	0,00	4,50	0,05	0,00-0,86	0,0050	100,00
VEGF2578:VEGF-936:MMP2-1306:TNF-308:TNF-238:IL-1B-31:IL-10-1082:IL-10-592	CC-CC-TC-GG-GG-TC-AG-CC	0,00	4,59	0,05	0,00-0,84	0,0047	100,00
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-863:TNF-308:TNF-238:IL-1B-31:IL-4-590	CC-CC-CC-CC-GG-TC-CT	0,00	4,17	0,05	0,00-0,93	0,0029	100,00
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-308:TNF-238:IL-1B-31:IL-10-1082:IL-10-592	CC-TC-CC-GG-GC-AG-CA	0,00	4,46	0,05	0,00-0,86	0,0050	100,00
VEGF2578:MMP2-1306:IL-1B-31:IL-10-1082	CC-TC-TC-AG	0,49	7,08	0,06	0,01-0,52	0,0013	99,51

Таблица 2 (продолжение)

Полиморфизмы	Комбинации генотипов	CD2	ЗД	OR	OR 95%CI	P(tmf ₂)	Sp
VEGF-936:MMP2-1306:TNF-238:IL-1B-31:IL-10-1082	CC-TG-GG-TG-AG	0,49	7,08	0,06	0,01-0,52	0,0013	99,51
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:IL-10-1082:IL-10-592	CC-TG-GG-TG-AG	0,48	8,04	0,06	0,01-0,44	0,0005	99,52
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-238:IL-10-1082:IL-10-592	CC-TG-GG-TG-AG	0,48	7,14	0,06	0,01-0,51	0,0012	99,52
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-238:IL-10-1082:IL-10-592	CA-TG-GG-TG-AG	0,00	4,08	0,06	0,00-0,96	0,0033	100,00
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-238:IL-10-1082:IL-10-592	CC-TG-GG-TG-AG	0,49	6,19	0,07	0,01-0,61	0,0035	99,51
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-238:IL-10-1082:IL-10-592	CC-TG-GG-TG-AG	0,49	6,19	0,07	0,01-0,61	0,0036	99,51
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-238:IL-10-1082:IL-10-592	CC-TG-GG-TG-AG	0,48	6,42	0,07	0,01-0,58	0,0028	99,52
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-238:IL-10-1082:IL-10-592	CC-TG-GG-TG-AG	0,49	6,19	0,07	0,01-0,62	0,0037	99,51
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-238:IL-10-1082:IL-10-592	CC-TG-GG-TG-AG	0,48	6,19	0,07	0,01-0,61	0,0034	99,52
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-238:IL-10-1082:IL-10-592	CC-TG-GG-TG-AG	0,49	6,25	0,07	0,01-0,61	0,0034	99,51
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-238:IL-10-1082:IL-10-592	CC-TG-GG-TG-AG	0,49	6,19	0,07	0,01-0,61	0,0035	99,51
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-238:IL-10-1082:IL-10-592	CA-TG-GG-TG-AG	0,50	6,90	0,07	0,01-0,55	0,0018	99,50
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-238:IL-10-1082:IL-10-592	CC-TG-GG-TG-AG	0,49	6,19	0,07	0,01-0,61	0,0036	99,51
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-238:IL-10-1082:IL-10-592	CC-TG-GG-TG-AG	0,48	6,25	0,07	0,01-0,60	0,0033	99,52
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-238:IL-10-1082:IL-10-592	CC-TG-GG-TG-AG	0,48	6,25	0,07	0,01-0,60	0,0033	99,52
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-238:IL-10-1082:IL-10-592	CC-TG-GG-TG-AG	0,49	6,19	0,07	0,01-0,62	0,0037	99,51
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-238:IL-10-1082:IL-10-592	CC-TG-GG-TG-AG	0,49	6,25	0,07	0,01-0,61	0,0034	99,51
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-238:IL-10-1082:IL-10-592	CA-TG-GG-TG-AG	0,48	6,25	0,07	0,01-0,60	0,0033	99,52
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-238:IL-10-1082:IL-10-592	CC-TG-GG-TG-AG	0,48	6,00	0,08	0,01-0,59	0,0013	99,52
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-238:IL-10-1082:IL-10-592	CC-TG-GG-TG-AG	0,48	5,45	0,08	0,01-0,66	0,0027	99,52
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-238:IL-10-1082:IL-10-592	CA-TG-GG-TG-AG	0,49	6,09	0,08	0,01-0,62	0,0038	99,51
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-238:IL-10-1082:IL-10-592	CC-TG-GG-TG-AG	0,49	6,09	0,08	0,01-0,59	0,0014	99,51
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-238:IL-10-1082:IL-10-592	CA-TG-GG-TG-AG	0,50	6,03	0,08	0,01-0,65	0,0045	99,50
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-238:IL-10-1082:IL-10-592	CA-TG-GG-TG-AG	0,50	6,03	0,08	0,01-0,64	0,0044	99,50
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-238:IL-10-1082:IL-10-592	CA-TG-GG-TG-AG	0,50	6,03	0,08	0,01-0,65	0,0045	99,50
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-238:IL-10-1082:IL-10-592	CC-TG-GG-TG-AG	0,49	5,83	0,08	0,01-0,65	0,0045	99,51
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-238:IL-10-1082:IL-10-592	CC-TG-GG-TG-AG	0,49	5,51	0,08	0,01-0,65	0,0022	99,51
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-238:IL-10-1082:IL-10-592	CA-TG-GG-TG-AG	0,49	5,47	0,08	0,01-0,66	0,0028	99,51
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-238:IL-10-1082:IL-10-592	CT-TG-GG-TG	0,48	5,03	0,09	0,01-0,72	0,0048	99,52
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-238:IL-10-1082:IL-10-592	CC-TG-GG-TG	0,96	10,00	0,09	0,02-0,40	0,0002	99,04
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-238:IL-10-1082:IL-10-592	CC-TG-GG-TG	0,48	5,13	0,09	0,01-0,71	0,0046	99,52
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-238:IL-10-1082:IL-10-592	CC-TG-GG-TG	0,49	5,35	0,09	0,01-0,67	0,0044	99,51
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-238:IL-10-1082:IL-10-592	CC-TG-GG-TG	0,96	9,09	0,10	0,02-0,45	0,0006	99,04
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-238:IL-10-1082:IL-10-592	CC-TG-GG-TG	0,99	8,54	0,11	0,02-0,47	0,0003	99,01

Таблица 2 (окончание)

Полиморфизмы	Комбинации генотипов	СД2	ЗД	OR	OR 95%CI	P(tmf ₂)	Sp
VEGF-936:MMP2-1306:TNF-308:IL-1B-31:IL-10-1082	CC-TC-GG-TC-AG	0,96	8,18	0,11	0,02-0,51	0,0015	99,04
VEGF2578:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-308:IL-1B-31:IL-10-592	CA-CC-CC-GG-TC-CC	0,98	8,17	0,11	0,03-0,49	0,0006	99,02
VEGF-936:MMP2-1306:TNF-308:TNF-238:IL-1B-31:IL-10-1082	CC-TC-GG-GG-TC-AG	0,96	7,27	0,12	0,03-0,59	0,0038	99,04
VEGF2578:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-308:TNF-238:IL-1B-31:IL-10-592	CA-CC-CC-GG-GG-TC-CC	0,98	7,46	0,12	0,03-0,54	0,0010	99,02
VEGF2578:VEGF-936:MMP2-1306:TNF-308:IL-10-1082	CC-CC-TC-GG-AG	0,97	7,14	0,13	0,03-0,61	0,0044	99,03
VEGF2578:VEGF-936:MMP2-1306:IL-10-1082:IL-10-592	CC-CC-TC-AG-CC	0,98	7,14	0,13	0,03-0,61	0,0045	99,02
VEGF-936:MMP2-1306:TNF-238:IL-4-590:IL-10-1082	CC-TC-GG-CT-AG	0,99	7,08	0,13	0,03-0,63	0,0050	99,01
VEGF-936:MMP2-1306:TNF-238:IL-10-1082:IL-10-592	CC-TC-GG-AG-CA	0,97	7,08	0,13	0,03-0,61	0,0045	99,03
VEGF2578:VEGF-936:MMP2-1306:TNF-308:TNF-238:IL-10-1082	CC-CC-TC-GG-GG-AG	0,97	7,14	0,13	0,03-0,61	0,0044	99,03
VEGF2578:VEGF-936:MMP2-1306:TNF-238:IL-10-1082:IL-10-592	CC-CC-TC-GG-AG-CC	0,98	7,14	0,13	0,03-0,61	0,0045	99,02
VEGF-936:MMP9-1562:TNF-308:TNF-238:IL-1B-31:IL-4-590	CC-CC-GG-GG-TC-CT	0,97	7,08	0,13	0,03-0,56	0,0015	99,03
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-238:IL-1B-31:IL-4-590:IL-10-1082	CC-CC-CC-GG-TT-CC-AG	0,99	7,34	0,13	0,03-0,60	0,0042	99,01
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-308:IL-4-590	CC-TC-CC-GG-CT	0,99	6,44	0,14	0,03-0,65	0,0035	99,01
VEGF2578:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-863:IL-1B-31:IL-10-592	CA-CC-CC-CC-TC-CC	0,98	6,73	0,14	0,03-0,61	0,0035	99,02
VEGF2578:MMP2-1306:TNF-863:TNF-308:IL-10-1082:IL-10-592	CA-CC-CC-GG-AG-CC	1,46	8,62	0,16	0,04-0,58	0,0028	98,54
VEGF2578:MMP2-1306:TNF-308:IL-10-1082:IL-10-592	CA-CC-GG-AG-CC	1,95	10,34	0,17	0,05-0,55	0,0020	98,05
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-863:TNF-308:IL-1B-31:IL-10-592	CC-CC-CC-CC-GG-TC-CC	1,45	7,69	0,18	0,05-0,62	0,0029	98,55
VEGF2578:MMP2-1306:TNF-308:TNF-238:IL-10-1082:IL-10-592	CA-CC-GG-GG-AG-CC	1,95	9,48	0,19	0,06-0,61	0,0041	98,05
VEGF2578:MMP2-1306:TNF-308:IL-1B-31:IL-4-590:IL-6-174	CA-CC-GG-TC-CC-GC	1,50	7,48	0,19	0,05-0,66	0,0040	98,50
VEGF-936:MMP2-1306:TNF-308:TNF-238:IL-1B-31:IL-6-174	CC-CC-GG-GG-TC-GG	1,44	7,29	0,19	0,05-0,65	0,0050	98,56
VEGF2578:MMP2-1306:MMP9-1562:IL-1B-31:IL-10-592	CA-CC-CC-TC-CC	1,95	8,65	0,21	0,07-0,63	0,0034	98,05
VEGF2578:MMP2-1306:TNF-308:IL-1B-31:IL-10-592	CA-CC-GG-TC-CC	2,44	10,33	0,22	0,08-0,58	0,0011	97,56
VEGF2578:MMP2-1306:TNF-863:TNF-308:IL-1B-31:IL-10-592	CA-CC-CC-GG-TC-CC	1,95	8,45	0,22	0,07-0,65	0,0036	98,05
VEGF2578:MMP2-1306:TNF-308:TNF-238:IL-1B-31:IL-10-592	CA-CC-GG-GG-TC-CC	2,44	9,71	0,23	0,09-0,63	0,0031	97,56
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:IL-10-1082	CC-TC-CC-AG	3,83	14,29	0,24	0,10-0,58	0,0013	96,17
VEGF-936:MMP2-1306:TNF-863:TNF-308:IL-1B-31:IL-10-592	CC-CC-CC-GG-TC-CC	2,90	10,66	0,25	0,10-0,63	0,0023	97,10
VEGF-936:MMP2-1306:MMP9-1562:TNF-238:IL-10-1082	CC-TC-CC-GG-AG	3,83	13,39	0,26	0,11-0,63	0,0026	96,17
VEGF-936:MMP2-1306:IL-10-1082	CC-TC-AG	7,18	20,35	0,30	0,15-0,61	0,0009	92,82
VEGF-936:MMP2-1306:TNF-308:IL-10-1082	CC-TC-GG-AG	5,74	16,81	0,30	0,14-0,65	0,0024	94,26
VEGF-936:MMP2-1306:TNF-238:IL-10-1082	CC-TC-GG-AG	6,70	19,47	0,30	0,15-0,61	0,0008	93,30
VEGF-936:MMP2-1306:TNF-308:TNF-238:IL-10-1082	CC-TC-GG-GG-AG	5,74	15,93	0,32	0,15-0,69	0,0043	94,26
VEGF2578:MMP2-1306:TNF-308:IL-4-590:IL-6-174	CA-CC-GG-CC-GC	5,00	13,70	0,33	0,16-0,70	0,0026	95,00
VEGF2578:MMP2-1306:TNF-308:TNF-238:IL-4-590:IL-6-174	CA-CC-GG-GG-CC-GC	4,50	12,26	0,34	0,15-0,74	0,0047	95,50
VEGF2578:MMP2-1306:TNF-308:IL-1B-31	CA-CC-GG-TC	6,80	16,20	0,38	0,20-0,72	0,0035	93,20

ТАБЛИЦА 3. РАЗЛИЧИЯ В ЧАСТОТЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ГЕНОТИПОВ ОТДЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РЕГУЛЯЦИИ АНГИОГЕНЕЗА В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ, ПОЗИТИВНО И НЕГАТИВНО АССОЦИИРОВАННЫХ С РАЗВИТИЕМ СД2

Полиморфизмы	Позитивные			Негативные			P(tmF ₂)
	N	n	%	N	n	%	
VEGF-2578	45	25	55,56	97	47	48,45	
CC	25	0	0,00	47	20	42,55	0,0001
CA	25	24	96,00	47	27	57,45	0,0004
AA	25	1	4,00	47	0	0,00	
VEGF-936	45	30	66,67	97	70	72,16	
CC	30	30	100,00	70	64	91,43	
CT	30	0	0,00	70	6	8,57	
TT	30	0	0,00	70	0	0,00	
MMP2-1306	45	10	22,22	97	92	94,85	0,0001
TT	10	1	10,00	92	0	0,00	
TC	10	0	0,00	92	60	65,22	0,0001
CC	10	9	90,00	92	32	34,78	0,0011
MMP9-1562	45	36	80,00	97	39	40,21	0,0001
CC	36	34	94,44	39	38	97,44	
CT	36	2	5,56	39	1	2,56	
TT	36	0	0,00	39	0	0,00	
TNF-863	45	10	22,22	97	18	18,56	
CC	10	9	90,00	18	18	100,00	
CA	10	1	10,00	18	0	0,00	
AA	10	0	0,00	18	0	0,00	
TNF-308	45	19	42,22	97	61	62,89	0,0288
GG	19	9	47,37	61	61	100,00	0,0001
GA	19	10	52,63	61	0	0,00	0,0001
AA	19	0	0,00	61	0	0,00	
TNF-238	45	18	40,00	97	43	44,33	
GG	18	18	100,00	43	43	100,00	
GA	18	0	0,00	43	0	0,00	
AA	18	0	0,00	43	0	0,00	
IL-1B-31	45	4	8,89	97	43	44,33	0,0001
TT	4	2	50,00	43	4	9,30	
TC	4	0	0,00	43	39	90,70	0,0004
CC	4	2	50,00	43	0	0,00	0,0056
IL-4-590	45	17	37,78	97	23	23,71	
CC	17	13	76,47	23	11	47,83	
CT	17	4	23,53	23	12	52,17	
TT	17	0	0,00	23	0	0,00	
IL-6-174	45	12	26,67	97	18	18,56	
GG	12	11	91,67	18	3	16,67	0,0001
GC	12	1	8,33	18	15	83,33	0,0001
CC	12	0	0,00	18	0	0,00	
IL-10-1082	45	28	62,22	97	66	68,04	
AA	28	28	100,00	66	0	0,00	0,0001
AG	28	0	0,00	66	65	98,48	0,0001
GG	28	0	0,00	66	1	1,52	
IL-10-592	45	11	24,44	97	52	53,61	0,0012
CC	11	9	81,82	52	30	57,69	
CA	11	2	18,18	52	22	42,31	
AA	11	0	0,00	52	0	0,00	

Примечание. N – общее количество комбинаций или генотипов; n – количество конкретных генотипов среди комбинаций генотипов; % – частота встречаемости генотипов; P(tmF₂) – значения P разности частот встречаемости генотипов в группах сравнения по двустороннему варианту точного метода Фишера.

ированных генетических признаков преобладает вариант *GC*.

Еще большие различия между группами позитивно и негативно ассоциированных с СД2 генетических комбинированных признаков установлены для гена *IL-10*. Преобладание гомозиготного варианта *CC* для полиморфизма в точке -592 в первой группе, сменяется равным представительством генотипов *CC* и *AC*, тогда как для полиморфизма этого гена в позиции -1082 установлена полная инверсия с 100% преобладанием гомозиготного варианта *AA* в первой группе на 100% преобладание гетерозиготного варианта *AG* в группе негативно ассоциированных с СД2 генетических признаков.

Обсуждение

Общей закономерностью, установленной после анализа этих данных может являться заключение о том, что в целом характер распределения (частоты встречаемости) генотипов анализируемых генов, связанных с ремоделированием сосудистой системы, в группе негативно ассоциированных с развитием СД2 генетических комбинаций, гораздо ближе к их распределению в группе здоровых лиц, по сравнению с группой позитивно ассоциированных с СД2 признаков. В составе генетических комбинаций, ассоциированных с СД2, присутствует большое число гомозиготных вариантов генов цитокинов, влияющих на уровень экспрессии их продуктов и, тем самым, определяющих особенности течения воспалительных процессов и состояние ангиогенеза. Об этом свидетельствуют данные, широко опубликованные нами в литературе за последние годы [3, 4, 6, 7]. Это подтверждает наше заключение о том, что наибольшие изменения в геноме ангиогенных факторов характерны для лиц, конституционально предрасположенных к развитию СД2, что делает этих лиц чрезвычайно чувствительными к провоцирующим факторам внешней среды при развитии этого заболевания с выраженной склонностью к быстрому формированию сосудистой патологии.

При анализе данных первых двух таблиц обращает на себя внимание их верхние строки в которых содержится информация о тех комбинированных генетических признаках, которые полностью отсутствуют в сопоставляемых группах здоровых и больных СД2. Для этих данных характерны и максимальные значения показателей отношения шансов и 100% специфичности признаков. Если эти результаты найдут свое подтверждение в расширенных многоцентровых исследованиях, можно судить о наличии генетических признаков с высокой достоверностью стратифицирующих популяцию жителей страны

на лиц у которых конституционально, с рождения, присутствует высокий риск развития СД2 и группу лиц с врожденной устойчивостью к развитию этого тяжелого заболевания. Представители первой группы должны с детства входить в группы высокого риска развития заболевания и являться объектом диспансерного наблюдения для снижения риска развития болезни.

Список литературы

1. Вейр Б. Анализ генетических данных. Дискретные генетические признаки. Пер. с англ. — М.: Мир, 1995. — 400 с.
2. Гланц С. Медико-биологическая статистика. Пер. с англ. — М.: Практика, 1998. — 459 с.
3. Коненков В.И., Голованова О.В., Прокофьев В.Ф., Шевченко А.В., Зонина Е.В., Королев М.А., Леонова Ю.Б., Халайджиди Н.А., Лапина С.А. Распределение аллельных вариантов промоторных участков генов цитокинов и гена фактора роста сосудистого эндотелия среди здоровых людей и пациентов с ревматоидным артритом в популяции европеоидного населения России // Вестник РАМН. — 2010. — № 9. — С. 9-14.
4. Коненков В.И., Прокофьев В.Ф., Шевченко А.В., Голованова О.В. Полиморфизм генов цитокинов как один из факторов демографической структуры европеоидного населения Сибири // Иммунология. — 2011. — № 2. — С. 60-65.
5. Повещенко А.Ф., Коненков В.И. Механизмы и факторы ангиогенеза // Успехи физиологических наук. — 2010. — Т. 41, № 2. — С. 68-89.
6. Шевченко А.В., Голованова О.В., Коненков В.И. Особенности полиморфизма промоторных регионов генов цитокинов *IL1*, *IL4*, *IL5*, *IL6*, *IL10* и *TNFα* европеоидного населения Западной Сибири // Иммунология. — 2010. — № 4. — С. 176-181.
7. Шевченко А.В., Голованова О.В., Коненков В.И., Толкачева О.М., Максимов В.Н., Воевода М.И., Ромашенко А.Г. Анализ полиморфизма генов матриксных металлопротеиназ-2 и -9 у пациентов с ишемической болезнью сердца // Терапевтический архив. — 2010. — Т. 82, № 1. — С. 31-35.
8. Awata T., Inoue K., Kurihara S. A common polymorphism in the 5'-untranslated region of the VEGF gene is associated with diabetic retinopathy in type 2 diabetes // Diabetes. — 2002. — N 51. — P. 1635-1639.
9. Banyasz I., Szabo S., Bokodi G., Vannay A., Vasarhelyi B., Szabo A., Tulassay T., Rigo J. Genetic polymorphisms of vascular endothelial growth factor in severe preeclampsia // Mol. Hum. Reprod. — 2006. — Vol. 12 (4). — P. 233-236.
10. Houck K.A. The vascular endothelial growth factor family: identification of a fourth molecular

species and characterization of alternative splicing of RNA // Mol. Endocrinol. – 1991. – N 5. – P. 1806-1814.

11. Kim J.K., Oh D., Kwak S.Y., Han J.H., Chung Y.S., Kim N.K. Genetic Polymorphism of Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF C936T) in the Korean Population // Korean J. Biol. Sci. – 2003. – Vol. 7. – P. 261-264.

12. Kondapaka S.B., Fridman R., Reddy K.B. Epidermal growth factor and amphiregulin up-regulate matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) in human breast cancer cells // Int. J. Cancer. – 1997. – N 70. – P. 722-726.

13. Krippel P., Langsenlehner U., Renner W. A common 936C/T gene polymorphism of vascular endothelial growth factor is associated with decreased breast cancer risk // Int. J. Cancer. – 2003. – N 106. – P. 468-471.

14. Lamblin N., Bauters Ch., Hermant X., Lablanche J.M., Helbecque N., Amouyel P. Polymorphisms in the Promoter Regions of MMP-2, MMP-3, MMP-9 and MMP-12 Genes as Determinants of Aneurysmal Coronary Artery Disease // J. Am. Coll. Cardiol. – 2002. – №40(1). – P. 43-48.

15. Zhang B., Ye S., Herrmann S.M., Eriksson P., de Maat M., Evans A., Arveiler D., Luc G., Cambien F., Hamsten A., Watkins H., Henney A.M. Functional polymorphism in the regulatory region of gelatinase B gene in relation to severity of coronary atherosclerosis // Circulation. – 1999. – N 99 (14). – P. 1788-1794.

поступила в редакцию 09.06.2012

отправлена на доработку 18.06.2012

принята к печати 22.06.2012